NCI-H889

305842

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

NCI-H889 est une lignée cellulaire humaine de cancer du poumon à petites cellules (SCLC) présentant des caractéristiques neuroendocrines. Elle a été établie à partir d'un patient adulte et est classée comme modèle classique de SCLC sur la base de critères morphologiques et moléculaires. Les cellules se développent en suspension et présentent la morphologie ronde à ovale typique du SCLC. La lignée NCI-H889 exprime plusieurs marqueurs neuroendocriniens et a été largement utilisée dans des études mécanistiques et pharmacologiques liées à ce sous-type agressif de cancer du poumon.
Sur le plan fonctionnel, NCI-H889 se caractérise par une signalisation autocrine via le facteur de croissance analogue à l'insuline II (IGF-II) et son récepteur IGF-R. Alors que l'ARNm de l'IGF-I est largement détecté dans les lignées cellulaires de cancer du poumon, la sécrétion directe de la protéine IGF-I est rare ; dans NCI-H889, le ligand prédominant impliqué dans la stimulation de la croissance est l'IGF-II. Cela concorde avec les résultats qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle les boucles de signalisation IGF-II/IGF-R sont des facteurs clés de la croissance autocrine dans les lignées cellulaires de SCLC. Ces interactions autocrines font de NCI-H889 un système précieux pour l'étude de la signalisation mitogène médiée par l'IGF et de sa perturbation thérapeutique.
Les analyses épigénétiques de NCI-H889 ont également permis de mieux comprendre la régulation de la réponse aux médicaments. Le profil de méthylation indique des altérations dans plusieurs gènes impliqués dans la réponse aux dommages de l'ADN, la régulation du cycle cellulaire et le contrôle transcriptionnel. Par exemple, NCI-H889 a été inclus dans des études montrant une méthylation et une expression différentielles de gènes tels que SLFN11, qui est associé à la sensibilité aux agents endommageant l'ADN, et EZH2, une histone méthyltransférase fréquemment régulée à la hausse dans le SCLC. Ces caractéristiques positionnent collectivement NCI-H889 comme un modèle préclinique pertinent pour explorer les vulnérabilités thérapeutiques associées aux tumeurs neuroendocrines du poumon.

Tissu	Métastatique
Maladie	Carcinome pulmonaire à petites cellules
Site métastatique	Ganglion lymphatique

Synonymes

- H889
- H-889
- NCIH889

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Femme
Propriétés de croissance	Suspension
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	Épithéliale
Type de cellule	Comme l'épithélium

IDENTIFIANTS

Référence

NCI-H889 (numéro de catalogue Cytion 305842)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1598

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Profil mutationnel

Mutation : TP53, simple, p.Cys242Ser (c.725G>C), non spécifiée (PubMed=1312696, PubMed=1565469).

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	69 ans
Origine ethnique	Caucasien

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Avertissement

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique, ni à être administrées à des êtres humains ou utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent se conformer à toutes les directives et réglementations applicables à la manipulation et à l'utilisation de ces cellules dans un cadre de recherche.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes