SNU-C1

305875

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

SNU-C1 rakuliin on inimese kolorektaalse kartsinoomi mudel, mis on loodud Korea täiskasvanud patsiendi astsiitvedelikust. See pärineb mõõdukalt diferentseeritud käärsoole adenokartsinoomist ja kuulub SNU-seeria rakuliinide rühma, mis on saadud kolorektaalse vähiga patsientidelt. SNU-C1 on kasutatud paljudes uuringutes, mis keskenduvad seedetrakti vähi bioloogiale ja farmakogenoomikale, tänu selle molekulaarsetele omadustele ja suhteliselt stabiilsetele kasvutunnustele in vitro tingimustes.
Genomiliselt iseloomustab SNU-C1 mikrosatelliitide ebastabiilsus (MSI), fenotüüp, mida esineb sageli kolorektaalse vähi alarühmas DNA-mismatch-parandussüsteemi (MMR) defektide tõttu. MSI-staatusel on oluline mõju ravimite tundlikkusele ja genoomi ebastabiilsusele. Hoolimata kolorektaalse kartsinoomi jaoks tüüpilistest mitmetest geneetilistest muutustest, sealhulgas mutatsioonidest sellistes võtmeprotsessides nagu WNT ja p53, on SNU-C1-l selged proteoomilised ja transkriptoomilised profiilid, mis muudavad selle sobivaks molekulaarse alatüübi klassifitseerimiseks ja suure läbilaskevõimega ravimireaktsiooni profiilide koostamiseks. See on lisatud suuremahulistesse andmekogudesse, nagu Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), kus proteoomiline kvantifitseerimine kinnitab epiteeli päritoluga ja MSI fenotüübiga kooskõlas olevaid ekspressioonimustreid. Need omadused muudavad SNU-C1 väärtuslikuks ressursiks MSI-kõrge kolorektaalse vähi ravivastuste uurimisel ja kolorektaalse vähi molekulaarse mitmekesisuse mõistmisel.

Kude	Metastaatiline
Haigus	Jämesoole adenokartsinoom
Metastaaside asukoht	Peritoneum

Sünonüümid

- SNUC1
- NCI-SNU-C1

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Vedrustus
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Morfoloogia	Ümarate rakuklastrite ujuvad agregaadid
Kahekordistumisaeg	31 tundi

TUNNUSED

Viide

SNU-C1 (Cytioni kataloginumber 305875)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_1708

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Mutatsiooniprofiil

Mutatsioon: geenifusioon, APIP + HGNC, SLC1A2, nimi(d)=APIP-SLC1A2, märkus=raamis. Mutatsioon, TP53, lihtne, p.Ser166Ter (c.497C>A), homosügootne

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Puudub

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	71 aastat
Etniline kuuluvus	Korea

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Vastutuse välistamine

Meie rakud on ette nähtud üksnes in vitro laboratoorseks uurimistööks ning need ei ole mõeldud kliiniliseks või diagnostiliseks kasutamiseks, samuti ei tohi neid manustada inimestele ega kasutada veterinaarsetel eesmärkidel. Kasutajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid suuniseid ja eeskirju nende rakkude käitlemise ja kasutamise kohta teadusuuringutes.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes