SNU-C1

305875

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De SNU-C1-cellijn is een model voor humaan colorectaal carcinoom dat is ontwikkeld op basis van ascitesvocht van een volwassen Koreaanse patiënt. Het is afkomstig van een matig gedifferentieerd adenocarcinoom van de dikke darm en maakt deel uit van een groep SNU-cellijnen die zijn afgeleid van patiënten met colorectale kanker. SNU-C1 is gebruikt in talrijke studies gericht op gastro-intestinale kankerbiologie en farmacogenomica vanwege zijn moleculaire kenmerken en relatief stabiele groeikenmerken onder in-vitro-omstandigheden.
Genomisch wordt SNU-C1 gekenmerkt door microsatellietinstabiliteit (MSI), een fenotype dat vaak wordt waargenomen bij een subgroep van colorectale kankers als gevolg van defecten in het DNA-mismatchreparatiesysteem (MMR). Deze MSI-status heeft belangrijke implicaties voor de gevoeligheid voor geneesmiddelen en genomische instabiliteit. Ondanks dat SNU-C1 meerdere genetische veranderingen bevat die vaak voorkomen bij colorectaal carcinoom, waaronder mutaties in belangrijke pathways zoals WNT en p53, vertoont het duidelijke proteomische en transcriptomische profielen die het geschikt maken voor moleculaire subtypeclassificatie en high-throughput-profilering van de respons op geneesmiddelen. Het is opgenomen in grootschalige datasets zoals de Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), waar proteomische kwantificering expressiepatronen bevestigt die consistent zijn met epitheliale oorsprong en MSI-fenotype. Deze eigenschappen maken SNU-C1 een waardevolle bron voor het bestuderen van therapeutische reacties bij MSI-hoge colorectale kankers en voor het begrijpen van de moleculaire diversiteit binnen colorectale tumoren.

Weefsel	Uitgezaaid
Ziekte	Colonadenocarcinoom
Plaats van uitzaaiingen	Peritoneum

Synoniemen

- SNUC1
- NCI-SNU-C1

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Ophanging
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Drijvende aggregaten van ronde celclusters
Verdubbelingstijd	31 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

SNU-C1 (Cytion-catalogusnummer 305875)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1708

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Mutatieprofiel

Mutatie: Genfusie, APIP + HGNC, SLC1A2, Naam(en)=APIP-SLC1A2, Opmerking=In frame. Mutatie, TP53, Eenvoudig, p.Ser166Ter (c.497C>A), Homozygoot

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Geen

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	71 jaar

Etnische afkomst	Koreaans

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Disclaimer

Onze cellen worden uitsluitend geleverd voor in vitro laboratoriumonderzoek en zijn niet bedoeld voor klinisch of diagnostisch gebruik, noch mogen ze worden toegediend aan mensen of worden gebruikt voor veterinaire doeleinden. Gebruikers moeten zich houden aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften voor het hanteren en gebruiken van deze cellen in een onderzoeksomgeving.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes