SU-DHL-1

305876

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

SU-DHL-1 е човешка клетъчна линия на анапластичен едроклетъчен лимфом (ALCL), създадена от плевралния излив на дете с диагноза дифузен хистиоцитен лимфом. Това е една от първите човешки лимфомни линии, създадени в непрекъсната култура, и е стриктно характеризирана както фенотипно, така и генетично. Морфологично SU-DHL-1 запазва характеристиките на първичния тумор, включително големи цитоплазмени вакуоли, които съдържат липиди. Хистохимичните изследвания показват активност на неспецифична естераза и кисела фосфатаза. За разлика от лимфобластоидните клетъчни линии, SU-DHL-1 е отрицателен за ядрения антиген на вируса на Епщайн-Барр (EBNA) и не експресира повърхностни имуноглобулини, което допълнително го отличава от линиите, получени от B-лимфоцити.
SU-DHL-1 е характерен модел за ALK-положителен ALCL поради хромозомната транслокация t(2;5)(p23;q35), която води до експресия на фюжън протеина NPM1-ALK. Този синтез осигурява конститутивна тирозин киназна активност и играе централна роля в онкогенезата на ALK+ ALCL. Клетъчната линия е част от панела LL-100 - подбран набор от модели на левкемия и лимфом за високопроизводително молекулярно профилиране. SU-DHL-1 е широко използван в проучвания, свързани с онкогенната сигнализация, разработването на целеви терапии и транскрипционната регулация в рамките на ALCL, което го прави ключов инструмент за разбирането и лечението на този агресивен подтип Т-клетъчен лимфом.

Тъкан	Плеврален излив
Заболяване	Анапластичен едроклетъчен лимфом, ALK-положителен

Синоними

- SU-DHL1
- SUDHL1
- SUDHL-1
- SuDHL-1
- SuDHL 1
- Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-1

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Окачване
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Лимфобластно-подобни
Тип клетка	Хистиоцитна клетка
Време за удвояване	~40-50 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

SU-DHL-1 (каталожен номер 305876 на Cytion)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_0538

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Експресия на антигена

Моноцитен маркер: CD163+ Лимфоиден маркер: Прогениторни маркери: CD45- Прогениторни маркери: CD10-, CD34- Маркери за активиране: CD30+, CD25+, CD70+, CD71+, CD80-, HLA-DR+, CD45- Маркери на Т-клетките: CD2-, CD3-, CD4-, CD5+, CD7-, CD8- Маркери на В-клетките: CD19-, CD20-, CD21-, CD22- Миеломоноцитни маркери: CD11b-, CD11c-, CD13-, CD14-, CD15-, CD33-

Онкогени

C-fms (протоонкоген); bcl-6+ (c-onc)

Мутационен профил

Мутация: Име(а)=NPM1-ALK (PubMed=7824924, PubMed=9121481, PubMed=25485619, PubMed=26657151, PubMed=29899875). Мутация, TP53, проста, p.Arg273His (c.818G>A), хетерозиготна (Cosmic-CLP=909742).

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	-
Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	10 години
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Отказ от отговорност

Нашите клетки се предоставят изключително за целите на лабораторни изследвания in vitro и не са предназначени за клинична или диагностична употреба, нито да се прилагат на хора или да се използват за ветеринарни цели. Потребителите трябва да се придържат към всички приложими насоки и разпоредби за боравене и използване на тези клетки в изследователска среда.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes