SU-DHL-1

305876

GENERAL INFORMATION

Description

בבני אדם, שנוצר מהתנקות פלאורלית של ילד שאובחן עם לימפומה (ALCL) הוא קו תאים של לימפומה אנאפלסטית של תאים גדולים SU-DHL-1 היסטיוציטית מפושטת. זה היה אחד מקווי הלימפומה הראשונים בבני אדם שנוצרו בתרבית רציפה, והוא אופיין בקפדנות הן מבחינה פנוטיפית והן מבחינה שומר על מאפייני הגידול הראשוני, כולל וקוולות ציטופלזמטיות גדולות המכילות שומנים. מחקרים היסטוכימיים SU-DHL-1, גנטית. מבחינה מורפולוגית הוא שלילי לאנטיגן גרעיני של נגיף SU-DHL-1, מראים פעילות של אסטראז לא ספציפי ושל פוספטאז חומצי. בניגוד לקווי תאים לימפובלסטואידים אפשטיין-בר (EBNA) ואינו מבטא אימונוגלובולינים על פני השטח, מה שמבדיל אותו עוד יותר מקווי תאים שמקורם בלימפוציטים B.
היתוך NPM1-ALK. המובילה לביטוי של חלבון היתוך t(2;5)(p23;q35) בשל טרנסלוקציה כרומוזומלית ALK-חיובי ל ALCL-הוא מודל מובהק ל SU-DHL-1 מערך מודלים של LL-100, קו התאים הוא חלק מפאנל ALK+ ALCL. זה מעניק פעילות טירוזין קינאז קונסטיטוטבית וממלא תפקיד מרכזי באונקוגנזה של שימש רבות במחקרים הקשורים לאיתות אונקוגני, פיתוח טיפולים ממוקדים SU-DHL-1. לוקמיה ולימפומה המיועד לפרופיל מולקולרי בתפוקה גבוהה T. מה שהופך אותו לכלי מרכזי בהבנה ובטיפול בסוג תוקפני זה של לימפומה של תאי ALCL, ורגולציה טרנסקריפטומית בתוך

Tissue	הצטברות נוזלים בחלל הצדר
Disease	חיובית-ALK, לימפומה אנאפלסטית של תאים גדולים

Synonyms

- SU-DHL1
- SUDHL1
- SUDHL-1
- SuDHL-1
- SuDHL 1
- Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-1

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	דמוי לימפוציט
Cell type	תא היסטיוציטי
Doubling time	~40-50 שעות

IDENTIFIERS

Citation

SU-DHL-1 (מספר קטלוגי Cytion 305876)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0538

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

סמן מונוציטים: CD163+
סמן לימפוציטים: CD45-
סמני אב קדמון: CD10-, CD34-
סמני הפעלה: CD30+, CD25+, CD70+, CD71+, CD80-, HLA-DR+, CD45-
סמני תאי T: CD2-, CD3-, CD4-, CD5+, CD7-, CD8-
סמני תאי B: CD19-, CD20-, CD21-, CD22-
סמני מיאלומונוציטים: CD11b-, CD11c-, CD13-, CD14-, CD15-, CD33-

Oncogenes

C-fms (פרוטו-אונקוגן); bcl-6+ (c-onc)

Mutational profile

מיזוג גנים: מוטציה, ALK + HGNC, NPM1, שם/שמות=NPM1-ALK (PubMed=7824924, PubMed=9121481, PubMed=25485619, PubMed=26657151, PubMed=29899875). מוטציה, TP53, פשוטה, p.Arg273His (c.818G>A), הטרוזיגוטית (Cosmic-CLP=909742).

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

FBS הוסף לתווך 10%

Dissociation reagent	-
Fluid renewal	עד 3 פעמים בשבוע 2

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו-מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה, או חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, CM-1 מספר קטלוגי) Cytion 800100),

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Shipping conditions

במהלך -Cשורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78°. ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	שנים 10
Ethnicity	קווקזי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Disclaimer

התאים שלנו מיועדים אך ורק למטרות מחקר במעבדה במבחנה, ואינם מיועדים לשימוש קליני או אבחוני, ולא מיועדים לטיפול בבני אדם או לשימוש וטרינרי. על המשתמשים להקפיד על כל ההנחיות והתקנות החלות על טיפול ושימוש בתאים אלה בסביבת מחקר.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">הצהרת האחריות שלנו

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB