SW1271

305880

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire SW1271 est un modèle de carcinome pulmonaire à petites cellules (CPPC) humain dérivé d'un patient adulte. Elle se caractérise par son phénotype neuroendocrinien, typique du CPPC, et présente des caractéristiques moléculaires liées à la sensibilité et à la résistance thérapeutiques. Dans le cadre d'une analyse exhaustive de la méthylation épigénomique de lignées cellulaires de CCP, dont la lignée SW1271, celle-ci a révélé des profils de méthylation de l'ADN spécifiques qui étaient en corrélation avec la chimiosensibilité à plusieurs classes de médicaments anticancéreux. Parmi ceux-ci figuraient les inhibiteurs de la kinase Aurora, les inhibiteurs de la CDK et les agents endommageant l'ADN. Le statut de méthylation de gènes clés tels que TREX1, SLFN11, CEP350 et KDM1A dans la lignée SW1271 et d'autres modèles de CPPC a été associé à une réponse altérée aux médicaments, ce qui implique que la modulation épigénétique est un facteur déterminant de l'efficacité thérapeutique.
De plus, la lignée SW1271 a été utilisée dans le cadre d'études génomiques et épigénomiques intégrées visant à comprendre les vulnérabilités spécifiques à chaque sous-type du CPPC. Cette lignée cellulaire, ainsi que d'autres représentant différents sous-types transcriptionnels du SCLC (ASCL1, NEUROD1, POU2F3 et YAP1), aide à cerner l'hétérogénéité au sein de la maladie. Le profil de méthylation de SW1271 contribue à notre compréhension des mécanismes de régulation affectant l'expression génique et la réponse aux médicaments, notamment la suppression des gènes suppresseurs de tumeurs et la dérégulation des facteurs de transcription spécifiques à la lignée. Ces connaissances font de SW1271 un modèle précieux pour l'étude des voies épigénétiques dans le CPPC et pour l'identification de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques potentiels.

Tissue	Poumon
Disease	Carcinome pulmonaire à petites cellules

Synonyms

- SW-1271
- SW 1271

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Épithélial
Cell type	Cellule épithéliale

IDENTIFIERS

Citation

SW1271 (numéro de catalogue Cytion 305880)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1716

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

Groupe sanguin A; Rh+

Mutational profile

Mutation : NRAS, simple, p.Gln61Arg (c.182A>G), homozygote; SMARCA4, simple, p.Asn774Lys (c.2322C>A), homozygote.Mutation, TP53, simple, p.Cys277Phe (c.830G>T), homozygote

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM : F12 de Ham (1:1), p/v : 3,1 g/L de glucose, p/v : 2,5 mM de L-glutamine, p/v : 15 mM d'HEPES, 0,5 mM de pyruvate de sodium, 1,2 g/L de $NaHCO_3$ (référence Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter au milieu 10 % de FBS, de l'AB et 5 µg/mL d'insuline

Dissociation reagent	Accutase
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L'entreposage à −80 °C n'est acceptable qu'à titre d'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	69 ans
Ethnicity	caucasien

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu'on prévoit entreposer un cryotube dans de l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d'échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d'éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Disclaimer

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique; elles ne doivent pas non plus être administrées à des humains ni utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent respecter toutes les lignes directrices et tous les règlements applicables concernant la manipulation et l'utilisation de ces cellules dans un contexte de recherche.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant
60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le
certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes