VMRC-RCZ

305886

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія VMRC-RCZ - це лінія нирковоклітинної карциноми людини (НКК), отримана від пацієнта з недрібноклітинним раком нирки. Її було отримано для дослідження біологічних і генетичних основ ниркового канцерогенезу, зокрема, хромосомних порушень і пухлинної прогресії. Цитогенетичний аналіз VMRC-RCZ виявив делецію короткого плеча хромосоми 9, зокрема в ділянці 9p21-22. Ця делеція означає втрату ключових генів-супресорів пухлин, таких як CDKN2A, який зазвичай асоціюється з різними злоякісними пухлинами і відіграє важливу роль у регуляції клітинного циклу.
У більш широкому аналізі геному раку VMRC-RCZ зробив внесок у картування гомозиготних делецій у різних типах пухлин. Ці дослідження показують, що такі ділянки, як 9p21, часто демонструють структурну нестабільність у ракових клітинних лініях, включаючи VMRC-RCZ, що свідчить про те, що геномні делеції в цій ділянці можуть надавати перевагу селективному росту під час еволюції пухлини. Крім того, VMRC-RCZ була включена в платформи геномного профілювання з високою роздільною здатністю для систематичної ідентифікації пов'язаних з раком мутацій і змін кількості копій, що робить її цінною моделлю для вивчення патогенезу РКС і дослідження потенційних терапевтичних вразливостей при злоякісних пухлинах нирок.

Тканина	Нирка
Хвороба	Нирково-клітинна карцинома
Місце метастазування	Ниркова

Синоніми

- VMRCRCZ
- Virginia Mason Research Center-Renal Cancer Z

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Не вказано
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

VMRC-RCZ (каталожний номер 305886)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_1791

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Профіль мутацій

Мутація: TP53, проста, p.Asp48Valfs*74 (c.143_146del4), гетерозиготна (Cosmic-CLP=909781), VHL, проста, c.463+2T>C, гетерозиготна, примітка=Сплайс донорська мутація (Cosmic-CLP=909781)

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

EMEM (MEM Eagle), w: 2 мМ L-глутамін, w: 2,2 г/л NaHCO3, w: EBSS (цит. номер 820100a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза
Коефіцієнт розподілу	Рекомендується співвідношення 1:6.
Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	Вік не вказано
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Застереження

Наші клітини призначені виключно для лабораторних досліджень in vitro і не призначені для клінічного або діагностичного використання, а також не можуть бути введені людям або використані у ветеринарних цілях. Користувачі повинні дотримуватися всіх застосовних інструкцій і правил щодо поводження з цими клітинами та їх використання в дослідницьких цілях.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes