WSU-HN6

305888

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

WSU-HN6 on inimese skvamooksütaarse kartsinoomi (SCC) rakuliin, mis on saadud ülemise hingamis- ja seedetrakti kasvajast, täpsemalt keele alusest. See kuulub ulatuslikku pea- ja kaelapiirkonna skvamooksütaarse kartsinoomi (HNSCC) rakuliinide paneeli, mis on loodud nende vähivormide bioloogia modelleerimiseks. WSU-HN6 on olnud oluline HNSCC-s levinud molekulaarseid muutusi iseloomustamisel, eriti neid, mis on seotud rakkude tsükli reguleerimise ja kasvu signaalide edastamise radadega.
See rakuliin näitab tsükliinist sõltuvate kinaaside (CDK), eriti CDK4 ja CDK6, kõrgenenud aktiivsust, mis on kooskõlas kasvajavastase p16INK4A inaktiveerimisega. Kuigi paljud HNSCC rakuliinid näitavad tsükliin D1 üleväljendamist, ei tee seda WSU-HN6, mis viitab alternatiivsetele teedele CDK aktiveerimiseks, nagu kinaasi üleväljendamine või negatiivsete regulaatorite kadu. Lisaks ekspresseerib WSU-HN6 looduslikku p53, kuid näitab rakkude tsükli kontrolli deregulatsiooni, mis viitab teistele molekulaarsetele defektidele, sealhulgas potentsiaalsetele puudujääkidele p21 funktsioonis või regulatsioonis.
Funktsionaalselt näitab WSU-HN6 kõrgenenud türosiini fosforüleerimist, mis peegeldab kasvut soodustavate retseptori türosiini kinaaside ebanormaalset aktiveerumist. Selles rakuliinis on dokumenteeritud epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) aktiivsuse suurenemine, kuigi EGFR valgu üleväljendamine on tagasihoidlik võrreldes teiste sama paneeli rakuliinidega. WSU-HN6 EGFR reageerib endiselt ligandi stimulatsioonile ja on funktsionaalselt terviklik. Need omadused muudavad WSU-HN6 väärtuslikuks in vitro mudeliks, mille abil uurida reguleerimata kasvusignaale ja CDK rada anomaaliaid pea- ja kaelapiirkonna vähivormide puhul.

Kude	Keel
Haigus	Rakk-kartsinoom

Sünonüümid

- HN6
- Wayne State University-Head and Neck 6

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

TUNNUSED

Viide

WSU-HN6 (Cytioni kataloginumber 305888)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_5516

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Mutatsiooniprofiil

Mutatsioon: TP53, Simple, p.His179Leu (c.536A>T), määratlemata

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

DMEM, w: 4,5 g/L glükoosi, w: 4 mM L-glutamiini, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM naatriumpüruvaati (Cytioni artikli number 820300a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	Täpsustamata vanus

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Vastutuse välistamine

Meie rakud on ette nähtud üksnes in vitro laboratoorseks uurimistööks ning need ei ole mõeldud kliiniliseks või diagnostiliseks kasutamiseks, samuti ei tohi neid manustada inimestele ega kasutada veterinaarsetel eesmärkidel. Kasutajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid suuniseid ja eeskirju nende rakkude käitlemise ja kasutamise kohta teadusuuringutes.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB