NCI-H2444

305904

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

NCI-H2444 е клетъчна линия от недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) при човека, класифицирана в спектъра на белодробния аденокарцином. Тя е създадена от проба от тумор на белия дроб, получена от възрастен пациент, и представлява епителиална злокачествена туморна формация с белодробен произход. Като част от мащабни усилия за фармакогеномна и мулти-омична характеристика, NCI-H2444 е молекулярно профилирана заедно с обширни панели от човешки ракови клетъчни линии, което позволява интегриране на данни за геномната, транскриптомната и фармакологичната реакция.
В обширни проучвания за чувствителност към лекарства на над 1000 ракови клетъчни линии, подложени на скрининг спрямо стотици противоракови съединения, модели на рак на белия дроб като NCI-H2444 са били използвани за корелация на онкогенни промени с терапевтични уязвимости :contentReference[oaicite:0]{index=0}. Тези анализи включват профили на соматични мутации, промени в броя на копията, модели на ДНК метилиране и данни за генна експресия, за да определят клинично значими функционални събития при рака и да ги свържат с диференциален отговор към лекарства. Такива набори от данни позволяват NCI-H2444 да бъде позициониран в специфични за линията и мутационно обусловени кластери на чувствителност, което подкрепя неговото приложение в откриването на биомаркери и оценката на целевата терапия.
Усилията за протеомно профилиране на стотици човешки ракови клетъчни линии допълнително разшириха рамката за молекулярна анотация, приложима за модели като NCI-H2444 :contentReference[oaicite:1]{index=1}. Високоразделителната масс-спектрометрична количествено определяне на хиляди протеини позволява интегрирането на измервания на протеомно ниво с транскриптомни и фармакологични набори от данни. Тази характеристика на системно ниво улеснява идентифицирането на протеинови биомаркери, предсказващи реакцията към лекарства, и подкрепя механистичните изследвания на активирането на пътищата, посттранскрипционната регулация и терапевтичната резистентност в модели на белодробен аденокарцином.

Тъкан	Бял дроб
Заболяване	Недребноклетъчен карцином на белия дроб

Синоними

- H2444
- H-2444
- NCIH244

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	епител

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

NCI-H2444 (номер в каталога на Cytion 305904)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_1552

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Мутационен профил

Мутация: p.Gly12Val, хомозиготна; Мутация: p.Tyr236Cys, хомозиготна

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	Неуточнена възраст
Етническа принадлежност	Кавказки

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB