NCI-H2444

305904

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

NCI-H2444 is een menselijke niet-kleincellige longkanker (NSCLC) cellijn die is geclassificeerd binnen het spectrum van longadenocarcinoom. Deze lijn is afkomstig van een longtumor van een volwassen patiënt en vertegenwoordigt een epitheliale maligniteit van pulmonale oorsprong. Als onderdeel van grootschalige farmacogenomische en multi-omics-karakteriseringsinspanningen is NCI-H2444 moleculair geprofileerd naast uitgebreide panels van menselijke kankercellijnen, waardoor integratie van genomische, transcriptomische en farmacologische responsgegevens mogelijk is geworden.
In uitgebreide onderzoeken naar de gevoeligheid voor geneesmiddelen van meer dan 1000 kankercellijnen die zijn gescreend op honderden antikankermiddelen, zijn longkankermodellen zoals NCI-H2444 gebruikt om oncogene veranderingen te correleren met therapeutische kwetsbaarheden :contentReference[oaicite:0]{index=0}. Deze analyses omvatten somatische mutatieprofielen, veranderingen in het aantal kopieën, DNA-methylatiepatronen en genexpressiegegevens om klinisch relevante functionele gebeurtenissen bij kanker te definiëren en deze te koppelen aan differentiële respons op geneesmiddelen. Dergelijke datasets maken het mogelijk om NCI-H2444 te positioneren binnen lijnspecifieke en mutatiegedreven gevoeligheidclusters, wat de toepassing ervan bij het ontdekken van biomarkers en het evalueren van gerichte therapieën ondersteunt.
Proteomische profilering van honderden menselijke kankercellijnen heeft het moleculaire annotatiekader dat van toepassing is op modellen zoals NCI-H2444 verder uitgebreid :contentReference[oaicite:1]{index=1}. Hoogwaardige kwantificering van duizenden eiwitten op basis van massaspectrometrie maakt integratie mogelijk van metingen op proteoomniveau met transcriptomische en farmacologische datasets. Deze karakterisering op systeemniveau vergemakkelijkt de identificatie van eiwitbiomarkers die de respons op geneesmiddelen voorspellen en ondersteunt mechanistische studies van pathway-activering, post-transcriptionele regulatie en therapeutische resistentie in longadenocarcinoommodellen.

Weefsel	Long
Ziekte	Long niet-kleincellig carcinoom

Synoniemen

- H2444
- H-2444
- NCIH244

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	epitheel

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

NCI-H2444 (Cytion-catalogusnummer 305904)

NCBI-belastingnummer	9606

Cellosaurus	CVCL_1552

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Mutatieprofiel

Mutatie: p.Gly12Val, homozygoot; Mutatie: p.Tyr236Cys, homozygoot

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	Leeftijd onbepaald
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB