Wil2-S

305905

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

WIL2-S on inimese B-lümfoblastoidne rakuliin, mis on saadud perifeersest verest lümfotsüütidest ja immortaliseeritud Epstein-Barr viiruse (EBV) infektsiooni abil. See pärineb tervelt täiskasvanud doonorilt ja näitab EBV-transformeeritud B-rakkudele iseloomulikke omadusi, sealhulgas suspensiooni kasvu, B-rakkude pinnamarkerite ekspressiooni ja stabiilset proliferatsiooni standardse lümfoidse kultuurikeskkonna puhul. Kuna WIL2-S on mitte-tuumorist pärinev, EBV-ga immortaliseeritud lümfoblastoidne liin, kasutatakse seda laialdaselt immunoloogia, genotoksilisuse ja DNA reparatsiooni uuringute võrdlusmudelina.
WIL2-S-i on laialdaselt kasutatud tsütogeneetilistes ja mutageneesi testides, eriti mikrotuumade ja kromosoomide ebastabiilsuse testides, tänu selle stabiilsele kariotüübile ja hästi iseloomustatud reaktsioonile DNA-d kahjustavatele ainetele. Rakuliin on pädev DNA-parandusradades ja on olnud võrdlusaluseks uuringutes, mis hindavad oksüdatiivset stressi, kiirgusest põhjustatud kahjustusi ja kemoteraapilist genotoksilisust. Tema lümfoidne päritolu ja reprodutseeritavad kasvukarakteristikud muudavad ta sobivaks klastogeensete ja aneugeensete mõjude hindamiseks in vitro kontrollitud katsetingimustes.
Kuna WIL2-S ei pärine pahaloomulisest kasvajast, vaid esindab EBV-immortaliseeritud normaalset B-rakkude liini, on see oluline baasmudel vähispetsiifiliste molekulaarsete muutuste eristamiseks üldistest lümfoidsetest rakuvastustest. Teadlased kasutavad seda rakuliini tavaliselt mittemuundatud võrdlusena genoomi stabiilsuse, immuunrakkude signaalimise ja rakkude stressivastuse mehhanismide uuringutes.

Kude	Põrnas
Haigus	Pärilik sferotsütoos

Sünonüümid

- WIL2-S
- WIL2/S
- WIL2S
- WIL2 Secreting

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Vedrustus
Bioloogilise ohutuse tase	2

OMADUSED

Morfoloogia	lümfoblast
Rakutüüp	B-rakk

TUNNUSED

Viide

Wil2-S (Cytion kataloogi number 305905)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_3809

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Mutatsiooniprofiil

Mutatsioon: p.Ser1163Ala, homosügootne

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Puudub

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	5 aastat
Etniline kuuluvus	Kaukaasia

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB