Wil2-S

305905

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione

WIL2-S è una linea cellulare linfoblastoide B umana derivata dai linfociti del sangue periferico e immortalizzata dall'infezione del virus di Epstein-Barr (EBV). Proviene da un donatore adulto sano e presenta caratteristiche tipiche delle cellule B trasformate dall'EBV, tra cui crescita in sospensione, espressione dei marcatori di superficie delle cellule B e proliferazione stabile in terreni di coltura linfoidi standard. Essendo una linea linfoblastoide non derivata da tumore e immortalizzata dall'EBV, WIL2-S è ampiamente utilizzata come modello di riferimento negli studi di immunologia, genotossicità e riparazione del DNA.
WIL2-S è stata ampiamente applicata nei test citogenetici e di mutagenesi, in particolare nei test del micronucleo e dell'instabilità cromosomica, grazie al suo cariotipo stabile e alla sua risposta ben caratterizzata agli agenti che danneggiano il DNA. La linea cellulare è competente nei percorsi di riparazione del DNA ed è stata utilizzata come comparatore in studi di valutazione dello stress ossidativo, dei danni indotti dalle radiazioni e della genotossicità chemioterapica. La sua origine linfoide e le caratteristiche di crescita riproducibili la rendono adatta alla valutazione degli effetti clastogenici e aneugenici in vitro in condizioni sperimentali controllate.
Poiché WIL2-S non deriva da un tumore maligno, ma rappresenta piuttosto una linea cellulare B normale immortalizzata dall'EBV, fornisce un importante modello di riferimento per distinguere le alterazioni molecolari specifiche del cancro dalle risposte cellulari linfoidi generali. I ricercatori utilizzano comunemente questa linea cellulare come riferimento non trasformato negli studi sulla stabilità del genoma, sulla segnalazione delle cellule immunitarie e sui meccanismi di risposta allo stress cellulare.

Tessuto	Milza
Malattia	Sferocitosi ereditaria

Sinonimi

- WIL2-S
- WIL2/S
- WIL2S
- WIL2 Secreting

CLASSIFICAZIONE

Organismo	Umano
Sesso	Maschio
Proprietà di crescita	Sospensione
Livello di biosicurezza	2

CARATTERISTICHE

Morfologia	linfoblasto
Tipo di cellula	cellula B

IDENTIFICATORI

Riferimento bibliografico

Wil2-S (numero di catalogo Cytion 305905)

Codice fiscale NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_3809

ESPRESSIONE E SUSCETTIBILITÀ

Profilo mutazionale

Mutazione: p.Ser1163Ala, omozigote

MANIPOLAZIONE E COLTURA

Terreno di coltura

RPMI 1640, w: 2,0 mM di glutammina stabile, w: 2,0 g/L di NaHCO3 (articolo Cytion numero 820700a)

Atmosfera di incubazione	37°C, 5%CO2, atmosfera umidificata.

Integratori

Integrare il terreno di coltura con il 10% di FBS

Reagente di dissociazione	Nessuno

Scongelamento e coltura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CRIOCONSERVAZIONE

Sterilità

La contaminazione da micoplasma viene esclusa utilizzando sia saggi basati sulla PCR sia metodi di rilevamento del micoplasma basati sulla luminescenza.
Per garantire l'assenza di contaminazione batterica, fungina o da lieviti, le colture cellulari sono sottoposte a ispezioni visive quotidiane.

Terreno di coltura congelato	Come terreno di crioconservazione, utilizziamo un terreno di crescita completo (incluso FBS) + 10% DMSO per un'adeguata vitalità post-scongelamento, o CM-1 (numero di catalogo Cytion 800100), che include osmoprotettori e stabilizzatori metabolici ottimizzati per migliorare il recupero e ridurre lo stress crio-indotto.

Condizioni di conservazione

Per la conservazione a lungo termine, porre le fiale in azoto liquido in fase vapore a una temperatura compresa tra -150 e -196 °C circa. La conservazione a -80 °C è accettabile solo come breve fase intermedia prima del trasferimento in azoto liquido.

Condizioni di spedizione

Le linee cellulari crioconservate vengono spedite su ghiaccio secco in confezioni isolate e convalidate, con una quantità di refrigerante sufficiente a mantenere circa -78 °C durante il trasporto. Al ricevimento, ispezionare immediatamente il contenitore e trasferire immediatamente le fiale in un luogo di conservazione appropriato.

DONATORE

Età dei donatori	5 anni

Etnia	Caucasico

ASPETTI LEGALI E DI SICUREZZA

Misure di sicurezza

Quando si prevede di conservare una crioviale in azoto liquido per un futuro scongelamento, è obbligatorio attenersi a rigorose misure di sicurezza. Guanti e indumenti protettivi appropriati sono essenziali e l'uso di una maschera facciale o di occhiali di sicurezza è richiesto durante il trasferimento dei campioni congelati da o verso il serbatoio di azoto liquido. Questo per ridurre il rischio di lesioni dovute a potenziali esplosioni di crioviali al momento della rimozione, che possono provocare la proiezione di frammenti taglienti.

Garanzia

Noi di Cytion garantiamo la qualità e la vitalità dei nostri prodotti.
Garantiamo che le nostre cellule saranno vitali all'inizio della coltura per 60 giorni dopo la spedizione dai nostri stabilimenti.
Assicuriamo che tutti i materiali sono conformi alle specifiche descritte nel Certificato di Analisi e/o nella Scheda Prodotto
Per tutti i dettagli, consultare la nostra <a href=""/Chi-siamo/Garanzia/"" hreflang=""x-default"">Dichiarazione di Garanzia

È richiesto un accordo di trasferimento di materiale	Yes