Hs 611.T

305915

GENERAL INFORMATION

Description

A Hs 611.T é uma linhagem celular de linfoma de Hodgkin clássico (LHC) humano, estabelecida a partir do linfonodo de uma mulher caucasiana de 48 anos. A linhagem é derivada do subtipo de linfoma de Hodgkin com esclerose nodular, rico em células T, um dos subtipos mais comuns de LHC. A Hs 611.T cresce em suspensão, apresentando morfologia semelhante à dos linfoblastos. Linhas celulares derivadas do linfoma de Hodgkin são relativamente raras devido à escassez das células malignas de Hodgkin-Reed-Sternberg (HRS) na massa tumoral; a Hs 611.T oferece um valioso modelo in vitro da biologia do cHL.
A Hs 611.T é aplicável na pesquisa do linfoma de Hodgkin, incluindo estudos sobre a sinalização das células HRS, a atividade da via NF-κB, a regulação da via JAK-STAT, a expressão de antígenos de superfície (incluindo CD30, CD15, CD25) e respostas a terapias direcionadas ao linfoma de Hodgkin, como o brentuximabe vedotina (ADC anti-CD30). A linhagem também é utilizada em ensaios imunológicos que avaliam a supressão de células T, a secreção de citocinas e as interações com o microambiente tumoral características do LCH. Por ser uma linhagem celular classificada como BSL-2, ela requer medidas de contenção adequadas.

Tissue	Nódulo linfático
Disease	Linfoma de Hodgkin
Metastatic site	Nódulo linfático

Applications

Pesquisa sobre o linfoma de Hodgkin; estudos sobre o NF-κB e a via JAK-STAT; ensaios de expressão de CD30/CD15/CD25; estudos de eficácia do brentuximab vedotin; microambiente tumoral; pesquisa em imunoterapia

Synonyms

- Hs-611-T
- Hs611T
- HS611T

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Do tipo linfoblasto
Cell type	Linfoblasto B
Doubling time	aproximadamente 24 a 48 horas

IDENTIFIERS

Citation

Hs 611.T (número de catálogo da Cytion 305915)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0823

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, p/v: 4,5 g/L de glicose, p/v: 4 mM de L-glutamina, p/v: 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v: 1,0 mM de piruvato de sódio (número de artigo da Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Dissociation reagent	Nenhum

Subculturing

Dilua a cultura para 3–5 × 10^5 células/ml com meio completo fresco e pré-aquecido. Pode-se recorrer à centrifugação (300×g, 5 min) quando for necessária a troca do meio. Conte as células viáveis antes da passagem para manter a densidade ideal. Não é necessária dissociação enzimática.

Split ratio	1 a 3
Seeding density	2 a 4 × 10^5 células/ml
Fluid renewal	A cada 2 ou 3 dias

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo + 10% de DMSO para garantir uma viabilidade adequada após o descongelamento.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	48 anos
Ethnicity	caucasiano

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB