Hs 611.T

305915

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Hs 611.T — це клітинна лінія класичної лімфоми Ходжкіна (cHL) людини, отримана з лімфатичного вузла 48-річної жінки кавказької раси. Лінія походить від підтипу лімфоми Ходжкіна з вузловим склерозом, багатого на Т-клітини, — одного з найпоширеніших підтипів cHL. Hs 611.T росте в суспензії, маючи лімфобластоподібну морфологію. Клітинні лінії, отримані з лімфоми Ходжкіна, є відносно рідкісними через нечисленність злоякісних клітин Ходжкіна-Рід-Штернберга (HRS) у пухлинній масі; Hs 611.T є цінною моделлю біології cHL in vitro.
Hs 611.T застосовується в дослідженнях лімфоми Ходжкіна, зокрема в дослідженнях сигнальних шляхів клітин HRS, активності шляху NF-κB, регуляції шляху JAK-STAT, експресії поверхневих антигенів (у тому числі CD30, CD15, CD25), а також реакції на терапії, спрямовані проти лімфоми Ходжкіна, такі як брентуксимаб ведотин (анти-CD30 ADC). Цю лінію також використовують в імунологічних аналізах для оцінки супресії Т-клітин, секреції цитокінів та взаємодій у мікросередовищі пухлини, характерних для cHL. Оскільки ця клітинна лінія класифікована як BSL-2, вона вимагає відповідних заходів ізоляції.

Тканина	Лімфатичний вузол
Хвороба	Лімфома Ходжкіна
Місце метастазування	Лімфатичний вузол

Застосування

Дослідження лімфоми Ходжкіна; дослідження шляхів NF-κB та JAK-STAT; аналізи експресії CD30/CD15/CD25; дослідження ефективності брентуксимабу ведотину; мікросередовище пухлини; дослідження імунотерапії

Синоніми

- Hs-611-T
- Hs611T
- HS611T

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Підвіска
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Лімфобластоподібні
Тип клітини	Лімфобласт B
Час подвоєння	приблизно від 24 до 48 годин

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

Hs 611.T (номер у каталозі Cytion 305915)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_0823

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO3, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Ні

Пересадка в нове середовище

Розведіть культуру до концентрації 3–5 × 10^5 клітин/мл свіжим, попередньо підігрітим повним середовищем. У разі необхідності заміни середовища можна провести центрифугування (300×g, 5 хв). Перед пересадкою підрахуйте кількість життєздатних клітин, щоб зберегти оптимальну щільність. Ферментативна дисоціація не потрібна.

Коефіцієнт розподілу	від 1 до 3
Щільність висіву	від 2 до 4 × 10^5 клітин/мл
Оновлення рідини	Кожні 2-3 дні

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 200 x g for 5 minutes, carefully discard the supernatant containing freezing medium.
Follow the procedure described under Post-Thaw Recovery

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Середовище для заморожування	В якості середовища для кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після розморожування.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	48 років
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes