# CHO-IL2RA

305980

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

**Опис**

Застереження: Ціни, вказані для клітинних ліній, призначені виключно для клієнтів з академічних та некомерційних організацій. Для комерційних організацій ціна становить приблизно 6 250 євро.
Якщо ви представляєте комерційну організацію або не впевнені, до якої категорії належите, будь ласка, зверніться до нас.
Клітини CHO-IL2RA — це рекомбінантні клітини яєчників китайського хом'яка (CHO), модифіковані для стабільної експресії альфа-субодиниці рецептора інтерлейкіну-2 людини (IL-2Rα; CD25/IL2RA) — високоафінної субодиниці цитокінового рецептора, що бере участь у регуляції активації Т-клітин та імунної гомеостази. CD25 входить до складу гетеротримерного комплексу рецептора IL-2 разом з IL-2Rβ (CD122) та загальною гамма-ланцюгом (CD132), забезпечуючи високоафінне зв'язування інтерлейкіну-2 та активацію низових сигнальних шляхів JAK/STAT. Фізіологічно CD25 високо експресується на активованих Т-лімфоцитах та регуляторних Т-клітинах (Tregs), а про аномальну експресію також повідомлялося у кількох гематологічних злоякісних новоутвореннях та запальних захворюваннях.
Клітини CHO-IL2RA широко використовуються в імунології та робочих процесах розробки терапевтичних засобів для характеристики моноклональних антитіл проти CD25, терапевтичних засобів на основі цитокінів, біспецифічних антитіл та стратегій націлювання на модифіковані імунні клітини. Стабільна рекомбінантна система експресії дозволяє проводити кількісну оцінку зв'язування ліганду, зайнятості рецептора, афінності антитіла та інтерналізації рецептора. Ці клітини також є цінними для розробки аналізів методом проточної цитометрії, тестування потенції, клітинних аналізів зв'язування та застосувань високопродуктивного скринінгу, що передбачають модуляцію шляху IL-2. Крім того, моделі CHO-IL2RA можуть підтримувати дослідження, що вивчають селективне націлювання на активовані Т-клітини або механізми, пов'язані з регуляторними Т-клітинами, в автоімунітеті, трансплантації та імунотерапії раку.

| | |
|---|---|
| **Тканина** | Яєчник |
| **Хвороба** | Яєчник китайського хом'яка, непухлинний; генетично модифікований для поверхневої експресії IL2RA (CD25) |

**Застосування**

Скринінг антитіл; розробка терапії, спрямованої на IL2RA; дослідження біології Т-клітин; дослідження аутоімунних захворювань; проточна цитометрія

## КЛАСИФІКАЦІЯ

| | |
|---|---|
| **Організм** | Китайський хом'як |
| **Секс** | Жінка |
| **Характеристики росту** | Адгезійний та суспензійний |
| **Статус ГМО** | GMO-S1 |

**Детальна інформація щодо статусу ГМО**

GMO-S1: This CHO cell line contains an IL2RA expression cassette supporting receptor-function analyses. This classification applies only within Germany and may differ elsewhere.

| | |
|---|---|
| **Рівень біобезпеки** | 1 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Морфологія** | Епітеліальноподібні |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

| | |
|---|---|
| **Тип клітини** | Епітеліальні клітини |
| **Час подвоєння** | приблизно 14–16 годин |

## ІДЕНТИФІКАТОРИ

**Посилання**

CHO-IL2RA (номер у каталозі Cytion 305980)

| | |
|---|---|
| **Ідентифікаційний номер платника податків NCBI** | 10029 |
| **Целозавр** | CVCL_A8W8 |

## ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

**Поверхневі антигени**

IL2RA (CD25)

## ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

**Живильне середовище**

Для адитивних культур: DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 г/л Глюкоза, w: 2,5 мМ L-глутамін, w: 15 мМ HEPES, w: 0,5 мМ піруват натрію, w: 1,2 г/л NaHCO3 (цит. номер 820400a)
Для суспензійних культур: Поживне середовище CHO A (від InSCREENeX; номер за каталогом InSCREENeX INS-ME-1039)

**Добавки**

Для адгезивних культур: Додайте до середовища 5% FBS. Додайте Geneticin (G418-Sulfat) для досягнення кінцевої концентрації 0,5 мг/мл.

| | |
|---|---|
| **Реагент для дисоціації** | Для адитивних культур: Трипсин-ЕДТА |

**Пересадка в нове середовище**

Для рутинного культивування адгезивних клітин: Аспіруйте старе культуральне середовище з адгезивних клітин і промийте їх PBS, щоб видалити залишки середовища. Після аспірації PBS додайте відповідний об'єм розчину трипсину/ЕДТА залежно від розміру культуральної посудини (наприклад, 1 мл для колби T25, 3 мл для колби T75) та інкубуйте при кімнатній температурі або 37°C протягом 5-10 хвилин, або поки клітини не відокремляться. Спостерігайте за відшаруванням під мікроскопом і, якщо необхідно, обережно постукайте по посудині, щоб звільнити клітини. Після відокремлення додайте повне середовище для інактивації трипсину/ЕДТА, обережно ресуспендуйте клітини і перенесіть аліквоту клітинної суспензії в нову культуральну посудину зі свіжим середовищем. Помістіть посудину в інкубатор, налаштований на 37°C з 5% CO2, і міняйте середовище кожні 2-3 дні.

| | |
|---|---|
| **Коефіцієнт розподілу** | від 1 до 5 |
| **Щільність висіву** | Від 2 до 5 x $10^4$ клітин/см2 |
| **Оновлення рідини** | 2-3 рази на тиждень |
| **Відновлення після відлиги** | Після розморожування розділіть клітини у співвідношенні 1:2 - 1:3 у колбах T25 і дайте клітинам відновитися після процесу заморожування і склеїтися (для адгезивних культур) протягом щонайменше 24 годин. |

**Розморожування та культивування**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

**Стерильність**

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

| | |
|---|---|
| **Середовище для заморожування** | Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу. |

**Умови зберігання**

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

**Умови доставки**

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

## ДОНОР

| | |
|---|---|
| **Вік донора** | Дорослий |

## ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

**Заходи безпеки**

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

**Застереження**

Наші клітини призначені виключно для лабораторних досліджень in vitro і не призначені для клінічного або діагностичного використання, а також не можуть бути введені людям або використані у ветеринарних цілях. Користувачі повинні дотримуватися всіх застосовних інструкцій і правил щодо поводження з цими клітинами та їх використання в дослідницьких цілях.

**Гарантія**

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Заяви про гарантію</a>

| | |
|---|---|
| **Діють угоди з третіми сторонами** | Yes |