J774A.1

400220

GENERAL INFORMATION

Description

J774A.1 □□□□□□□□□□ BALB/c/NIH □□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Receptors expressed

□□□□□□Fc□□□□□□C3□

Products

□□□□□-1□□□□□□□ 1□IL-1□LAF□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM□□ 4.5 g/L □□□□4 mM L-□□□□□3.7 g/L $NaHCO_3$ □ 1.0 mM □□□□□Cytion □□□□ 820300a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% □□□□□□FBS□

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□□□□□□□□T25 □□□□□ 3-5 □□□T75 □□□□□ 5-10 □□□□ □□ Accutase□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DONOR

Breed / subspecies	BALB/c
Donor age	□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□