RAW 264.7

400319

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A RAW 264.7 sejtek egy széles körben használt egér makrofág sejtvonal, amely az Abelson egér leukémiavírus által indukált daganatos hím egér aszcitiszéből származik, és gyakran használják az immunológiai és fertőző betegségek kutatásában. Immortalizált sejtvonalként a RAW264.7 sejtek kulcsfontosságú modellrendszerek a makrofágok biológiájának tanulmányozására, beleértve a kórokozókra adott immunválaszokat, a jelátvitelt és a génexpressziót.
A RAW264.7 sejtek különösen értékesek makrofág-szerű sejtekké való differenciálódási képességük miatt. Ezek a sejtek M1 makrofágokká polarizálódhatnak, amelyek gyulladásos válaszokhoz kapcsolódnak, vagy M2 makrofágokká, amelyek a szövetek helyreállításához és gyulladáscsökkentő folyamatokhoz kapcsolódnak. Ez a polarizációs képesség, valamint az olyan alapvető makrofág funkciók ellátására való képességük, mint a pinocitózis és a fagocitózis, kiemeli jelentőségüket a makrofágok biológiájának, valamint az immunválaszok és a kórokozók közötti összetett kölcsönhatás tanulmányozásában.
A RAW 264.7 sejtek fontos szerepet játszanak az immunrendszer különböző tényezőkkel, köztük a kórokozókkal és a csontok biológiájával való kölcsönhatásainak tanulmányozásában. A RAW264.7 sejtek bizonyos körülmények között, például RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor κB Ligand) expozícióval, csontklaszt-szerű sejtekké differenciálódhatnak, így modellként szolgálnak az oszteoklaszt biológia és a csontfelszívódás bizonyos aspektusainak tanulmányozására.
A RAW264.7 sejtvonal különböző ingerekre adott válasza, beleértve a piroptózis indukcióját, amely egy gyulladásos sejthalál folyamat, amelyet olyan tényezők váltanak ki, mint az LPS (lipopoliszacharid), fontos szerepet játszik a gyulladásos citokintermeléshez vezető útvonalak feltárásában. A környezeti feltételek, például az extracelluláris glükózszint sejtfunkcióra és fenotípusra gyakorolt hatása betekintést nyújt a sejtek anyagcseréjébe és a gyulladásos válaszok lehetséges visszaszabályozásába.
A RAW264.7 sejtek, amelyek eredete egérleukémiából származik, és amelyeket széles körben használnak az immunológiai kutatásokban, kulcsfontosságú eszközként szolgálnak a makrofágok biológiájának, az immunrendszer-patogén dinamikájának, az oszteoimmunológiának és a gyulladásos válaszoknak a megértésében, kiemelve nélkülözhetetlen szerepüket mind az alap-, mind az alkalmazott orvosbiológiai kutatásban.

Szövet	Ascites
Betegség	Leukémia

Szinonimák

- RAW264
- RAW2647
- RAW264.7
- RAW-264.7
- Raw 264.7
- Raw264.7

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Egér
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	2

JELLEMZŐK

Sejttípus	Makrofágok

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Kettőzési idő	A RAW264.7 sejtek megduplázódási ideje 11 és 30 óra között mozog

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

RAW 264.7 (Cytion katalógusszám 400319)

NCBI adóazonosító szám	10090
Cellosaurus	CVCL_0493

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Kifejeződő receptorok

Immunglobulin (Fc), komplement (C3)

Antigén-expresszió

H-2d

Vírusok

A sejtvonalat megvizsgálták, és a sejttenyésztési felülúszóban és a sejtkivonatban pozitívnak találták a C-típusú retrovírusok reverz transzkriptáz (RT) aktivitását. Ectromelia vírus (egérhimlő) szekretálódhat.

Termékek

Lizinozim

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO_2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Erősen tapadó cellák, cellakaparó használata

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Ültetési sűrűség	4 x 10^4 sejt/cm^2
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Faj / alfaj	BALB/c
Az adományozó életkora	Felnőtt

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Jogi nyilatkozat

Sejtjeinket kizárólag in vitro laboratóriumi kutatási célokra bocsátjuk rendelkezésre, és nem szánjuk klinikai vagy diagnosztikai felhasználásra, nem adhatóak be embereknek, és nem használhatók fel állatorvosi célokra. A felhasználóknak be kell tartaniuk a sejtek kutatási környezetben történő kezelésére és felhasználására vonatkozó valamennyi vonatkozó irányelvet és előírást.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB