WEHI-3B

400376

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De WEHI-3B cellijn is een muriene leukemie cellijn die uitgebreid gebruikt wordt als model voor het bestuderen van myelomonocytische differentiatie en de pathofysiologie van leukemie. Deze cellen, oorspronkelijk afkomstig van BALB/c muizen, vertonen kenmerken van myeloïde progenitorcellen en zijn van groot belang geweest bij het onderzoek naar hematopoëtische differentiatie en regulatie. De WEHI-3B lijn is vooral belangrijk voor onderzoek naar de invloed van groeifactoren op leukemische cellen en is gebruikt om de hematopoëtische activiteit van verschillende stoffen, waaronder koloniestimulerende factoren, te evalueren.
Deze cellijn is niet alleen belangrijk voor het gebruik in leukemieonderzoek, maar dient ook als hulpmiddel bij het bestuderen van macrofaag- en granulocytfuncties, dankzij het vermogen om onder bepaalde experimentele omstandigheden in deze celtypen te differentiëren. Studies met WEHI-3B cellen hebben bijgedragen aan een beter begrip van de moleculaire routes die betrokken zijn bij celdifferentiatie en de invloed van genetische veranderingen op de progressie van leukemie. Bovendien wordt de WEHI-3B cellijn gebruikt voor het testen van de biologische activiteit van monocytische koloniestimulerende factor (M-CSF) en granulocyt-macrofaag koloniestimulerende factor (GM-CSF), wat de veelzijdigheid en bruikbaarheid in hematologische onderzoekscontexten benadrukt.

Weefsel	Perifeer bloed
Ziekte	Leukemie

Synoniemen

- WEHI-3b
- Wehi-3B
- WEHI 3B
- WEHI3B

CLASSIFICATIE

Organisme	Muis
Groei-eigenschappen	Ophanging
Bioveiligheidsniveau	2

KENMERKEN

Celtype	Myelomonocyt

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

WEHI-3B (Cytion catalogusnummer 400376)

NCBI-belastingnummer	10090
Cellosaurus	CVCL_2239

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Tot expressie gebrachte receptoren

Immunoglobuline (Fc), complement (C3)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Virussen

Ectromelia virus (muispokken) negatief

Producten

Lysozym, granulocyt-koloniestimulerende activiteit (G-CSA), interleukine-3 (interleukine 3, IL-3)

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Heruitplanten

Kweken kunnen worden onderhouden door toevoeging of vervanging van vers medium. Begin kweken met 5 x 10^5 cellen/ml en houd ze tussen 3 x 10^5 en 1x10^6 cellen/ml. Hechtende cellen kunnen worden teruggewonnen door ze af te schrapen.

Zaaidichtheid	1 x 10^5 cellen/ml
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week
Herstel na ontdooiing	Laat de cellen na het ontdooien minstens 24 uur bijkomen van het vriesproces.

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Soort / ondersoort	BALB/c

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Disclaimer

Onze cellen worden uitsluitend geleverd voor in vitro laboratoriumonderzoek en zijn niet bedoeld voor klinisch of diagnostisch gebruik, noch mogen ze worden toegediend aan mensen of worden gebruikt voor veterinaire doeleinden. Gebruikers moeten zich houden aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften voor het hanteren en gebruiken van deze cellen in een onderzoeksomgeving.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes