WEHI-3

400381

SPLOŠNE INFORMACIJE

Opis

Celična linija WEHI-3 je celična linija za mišjo levkemijo, pridobljena iz seva BALB/c. Prvotno je bila ustvarjena iz spontane mielomonocitne levkemije, ki so jo odkrili pri miših. Ta celična linija se pogosto uporablja kot model za preučevanje mieloične diferenciacije in imunskega odziva, zlasti mehanizmov, na katerih temelji napredovanje levkemije, in odziva levkemičnih celic na različna zdravljenja. Celice WEHI-3 lahko proizvajajo interlevkin-3 (IL-3) in se pogosto uporabljajo v raziskavah kot vir tega citokina.
V laboratorijskem okolju se celice WEHI-3 uporabljajo za ocenjevanje diferenciacijskega potenciala različnih spojin in bioloških aktivnosti, ki modulirajo krvotvorni sistem. Te celice so se izkazale za ključne pri razumevanju, kako spremembe v izražanju genov vplivajo na mieloične celice, in so ključno orodje pri razvoju terapevtskih strategij proti mieloičnim levkemijam. Celična linija se uporablja tudi in vivo za vzpostavitev mišjih modelov bolezni s presaditvijo v dovzetne seve miši, kar omogoča študije napredovanja tumorjev in učinkovitosti protirakavih zdravil.

Tkivo	Periferna kri
Bolezen	Levkemija

Sinonimi

- WEHI 3
- WEHI3
- Wehi-3

RAZVRSTITEV

Organizem	Miška
Lastnosti rasti	Vzmetenje
Stopnja biološke varnosti	2

ZNAČILNOSTI

Morfologija	Makrofagom podobni
Vrsta celice	Mielomonociti

IDENTIFIKATORJI

Navajanje vira

WEHI-3 (kataloška številka Cytion 400381)

Davčna identifikacijska številka NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_3622

IZRAŽANJE IN DOVZETNOST

Izraženi receptorji

Imunoglobulin (Fc), komplement (C3)

Virusi

Ektromelia virus (mišje ošpice) negativen

Izdelki

Lizocim, aktivnost za spodbujanje kolonij granulocitov (G-CSA), interlevkin-3 (interlevkin 3, IL-3)

RAVNANJE IN GOJENJE

Gojišče

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilnega glutamina, w: 2,0 g/L NaHCO3 (številka izdelka Cytion 820700a)

Inkubacijska atmosfera	37 °C, 5 %CO2, vlažno ozračje.

Prehranska dopolnila

Gojišče dopolnite z 10 % FBS

Preusmeritev v drugo kulturo

Kulture se lahko vzdržujejo z dodajanjem ali zamenjavo svežega medija. Kulture začnite z 5 x 10^5 celicami/ml in jih vzdržujte med 3 x 10^5 in 1x10^6 celicami/ml. Adherentne celice se lahko pridobijo s strganjem.

Obnova tekočine	2 do 3-krat na teden

Odtaljevanje in gojenje

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KAKOVOSTI IN KRIOPREZERVACIJA

Sterilnost

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.
Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.

Medij za zamrzovanje	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (kataloška številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.

Pogoji shranjevanja

Za dolgotrajno shranjevanje viale postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196 °C. Shranjevanje pri -80 °C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Pogoji dostave

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78 °C. Ob prejemu takoj preglejte embalažo in viale nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

DONATOR

Pasma / podvrsta	BALB/c

PRAVNE ZADEVE IN VARNOST

Varnostni ukrepi

Pri načrtovanju shranjevanja kriovialov v tekočem dušiku za kasnejše odtaljevanje je treba obvezno upoštevati stroge varnostne ukrepe. Nujni so ustrezne zaščitne rokavice in oblačila, med prenosom zamrznjenih vzorcev v rezervoar s tekočim dušikom ali iz njega pa je potrebna uporaba obrazne maske ali zaščitnih očal. S tem se zmanjša tveganje poškodb zaradi morebitnih eksplozij kriovialov pri odstranjevanju, ki lahko povzročijo izstrelitev ostrih delcev.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Naše celice so na voljo izključno za laboratorijske raziskave in vitro in niso namenjene za klinično ali diagnostično uporabo, niti jih ni dovoljeno dajati ljudem ali uporabljati v veterinarske namene. Uporabniki morajo upoštevati vse veljavne smernice in predpise za ravnanje in uporabo teh celic v raziskovalnem okolju.

Garancija

V podjetju Cytion stojimo za kakovostjo in uporabnostjo svojih izdelkov.
Zagotavljamo, da bodo naše celice ob začetku gojenja še 60 dni po odpremi iz naših obratov vitalne.
Zagotavljamo, da so vsi materiali skladni s specifikacijami, opisanimi v potrdilu o analizi in/ali listu izdelka
Za vse podrobnosti si oglejte našo <a href=""/Kdo smo/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garancijsko izjavo

Potreben je sporazum o prenosu materiala	Yes