L-138

400384

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

L-138 ląstelių linija, dar žinoma originaliu pavadinimu M138, yra melanomos ląstelių linija, gauta iš odos melanomos. Melanoma yra odos vėžio rūšis, atsirandanti iš melanocitų - ląstelių, atsakingų už melanino gamybą. Ši ląstelių linija buvo labai svarbi siekiant suprasti paviršiaus antigenus, susijusius su melanoma ir melanocitų diferenciacija. L-138 ląstelėms būdinga specifinių antigenų, apibrėžiančių melanomos pogrupius, raiška, o tai padeda klasifikuoti ir diferencijuoti melanomos tipus pagal antigeninius profilius
L-138 ląstelės pasižymi unikaliais paviršiaus antigenais, įskaitant M-24 antigeną, identifikuojamą naudojant monokloninius antikūnus. Šie antigenai buvo ištirti serologiškai, atskleidžiant, kad L-138 ląstelių linija išreiškia antigenus, aptinkamus keliais melanomai būdingais monokloniniais antikūnais. Tarp jų yra HLA-A, B, C antigenai ir β2-mikroglobulinas, kurie yra labai reaktyvūs daugumoje melanomos ląstelių linijų, o tai suteikia įžvalgų apie melanomos ląstelių imuninį atpažinimą ir klasifikaciją: citation[oaicite:0]{index=0}
Be to, L-138 ląstelių linija buvo panaudota tirozinazės, fermento, būtino melanino sintezei, aktyvumo tyrimams. Tirozinazės aktyvumas L-138 ląstelėse buvo matuojamas naudojant radiožymėtą tiroziną, o tai įrodo melanomos ląstelių funkcines savybes pigmentų gamyboje. Šis aktyvumas palygintas su nepigmentuotomis inkstų vėžio ląstelėmis, parodant skirtingą melanomos fermentinį aktyvumą. Tokie tyrimai padeda išsiaiškinti medžiagų apykaitos kelius ir galimus terapinius taikinius melanomai gydyti

Audinys	Hematopoetinė, hibridoma

Sinonimai

- M138
- M 138
- M-24 (M138)
- M-24
- L138

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Pele
Augimo savybės	Pakaba
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Apvalios ląstelės
Ląstelių tipas	Limfoblastai

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

L-138 (Cytion katalogo numeris 400384)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	10090
Cellosaurus	CVCL_J758

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Produktai

Monokloninis antikūnas (imunoglobulinas, IgG1) prieš žmogaus odos melanocitus (M-24 antigeno sistema). CLS negarantuoja šios ląstelių linijos antikūnų gamybos.

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Subkultūrinis auginimas

Kultūras prižiūrėkite periodiškai papildydami arba keisdami terpę. Kultūras pradėkite su 5 x 10^5 ląstelių/ml tankiu ir, siekdami optimalaus augimo, palaikykite ląstelių koncentraciją nuo 3 x 10^5 iki 1 x 10^6 ląstelių/ml.

Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Veislė / porūšis	BALB/c

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Atsakomybės apribojimas

Mūsų ląstelės teikiamos tik in vitro laboratoriniams tyrimams ir nėra skirtos klinikiniam ar diagnostiniam naudojimui, jos taip pat nėra skirtos žmonėms ar naudojamos veterinarijos tikslais. Naudotojai privalo laikytis visų galiojančių rekomendacijų ir taisyklių, taikomų šių ląstelių tvarkymui ir naudojimui mokslinių tyrimų aplinkoje.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href="/Kas mes esame/garantijos/" hreflang="x-default">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB