Neuro-2a

400394

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

Neuro-2a-cellelinjen, der ofte forkortes N2A-celler, er en neuroblastom-cellelinje fra mus, der stammer fra neurallisten. Disse celler er kendt for deres hurtige spredning og evne til at differentiere sig til neuronlignende celler under visse forhold, hvilket gør dem til en værdifuld model til undersøgelse af neurogenese og neuronal differentiering. Neuro-2a-celler udviser karakteristika, der er typiske for nerveceller eller neuroblaster, som er forstadier til fuldt differentierede neuronale celler.
Et af de vigtigste træk ved musens Neuro-2a-celler er deres anvendelighed til at udforske differentieringsmekanismerne, især i forbindelse med dopaminerge neuroner. Disse celler kan induceres til at udtrykke markører, der er karakteristiske for dopaminneuroner, herunder dopamintransportøren og proteiner, der er involveret i lokalisering af dopaminreceptorer. Det gør N2A-cellelinjen til et vigtigt værktøj til undersøgelser af det normale neuroendokrine system og lidelser, der er forbundet med dopaminerg signalering.
N2A-cellelinjen giver også indsigt i forskellige generes og proteiners rolle i neuronal funktion og udvikling. For eksempel er DNMT3A-genet, der er kendt for sin involvering i DNA-methyleringsprocesser, blevet undersøgt i Neuro-2a-celler for at forstå dets indvirkning på neuronale celler og neuroudviklingsprocesser. Udtrykket af den humane skjoldbruskkirtelhormonreceptor i disse celler gør det muligt for forskere at undersøge skjoldbruskkirtelhormonrespons og dens indflydelse på neuroudvikling og differentiering af neuroblastomceller til mere modne neuronale fænotyper. Proteinkinase-signalveje er et andet område, der studeres intenst i N2A-celler, da de spiller en afgørende rolle i formidlingen af forskellige cellulære processer, herunder cellevækst, differentiering og respons på ekstracellulære signaler.
Sammenfattende fungerer Neuro-2a (N2A)-cellelinjen, der stammer fra musens neuroblastom, som en alsidig model til undersøgelse af neurogenese, neuronal differentiering og dopaminerg signalering, hvilket giver værdifuld indsigt i det molekylære grundlag for neuroudviklingsprocesser og neuroendokrine lidelser.

Sygdom	Neuroblastom

Synonymer

- NEURO-2A
- Neuro 2a
- Neuro2a
- Neuro2A
- N-2a
- N2a
- N2A
- Nb2a
- NB2a

KLASSIFICERING

Organisme	Mus
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Celletype	Neuronale og amøboide stamceller

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

Neuro-2a (Cytion katalognummer 400394)

NCBI-skattenummer	10090
Cellosaurus	CVCL_0470

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Antigenudtryk

H-2a

Vira

Ectromelia-virus (musekopper): negativ

Virusresistens

Poliovirus 1

Revers transkriptase	Negativ

Produkter

Tubulin, acetylcholinesterase

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS og 1% NEAA

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Såtæthed	1 x 10^4 celler/cm^2
Væskeudskiftning	1 til 2 gange om ugen
Genopretning efter optøning	Efter optøning skal cellerne udplades med 5 x 10^4 celler/cm^2, og cellerne skal have lov til at komme sig efter frysningsprocessen og hæfte sig fast i mindst 24 timer.

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Race / underart	A/J

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Ansvarsfraskrivelse

Vores celler leveres udelukkende til in vitro-laboratorieforskningsformål og er ikke beregnet til klinisk eller diagnostisk brug, og de må heller ikke administreres til mennesker eller bruges til veterinære formål. Brugere skal overholde alle gældende retningslinjer og regler for håndtering og brug af disse celler i en forskningsmæssig sammenhæng.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes