Neuro-2a

400394

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A linha celular Neuro-2a, frequentemente abreviada como células N2A, é uma linha celular de neuroblastoma de ratinho derivada da crista neural. Estas células são conhecidas pela sua rápida proliferação e capacidade de se diferenciarem em células semelhantes a neurónios em determinadas condições, o que as torna um modelo valioso para o estudo da neurogénese e da diferenciação neuronal. As células Neuro-2a apresentam caraterísticas típicas de células nervosas ou neuroblastos, que são precursores de células neuronais totalmente diferenciadas. Uma das principais caraterísticas das células Neuro 2a do rato é a sua utilidade para explorar os mecanismos de diferenciação, em particular no contexto dos neurónios dopaminérgicos. Estas células podem ser induzidas a expressar marcadores caraterísticos dos neurónios dopaminérgicos, incluindo o transportador de dopamina e as proteínas envolvidas na localização dos receptores de dopamina. Este facto torna a linha celular N2A uma ferramenta essencial para estudos relacionados com o sistema neuroendócrino normal e com perturbações associadas à sinalização dopaminérgica.
A linha celular N2A também fornece informações sobre o papel de vários genes e proteínas na função e desenvolvimento neuronais. Por exemplo, o gene DNMT3A, conhecido pelo seu envolvimento nos processos de metilação do ADN, foi estudado em células Neuro-2a para compreender o seu impacto nas células neuronais e nos processos de neurodesenvolvimento. A expressão do recetor da hormona tiroideia humana nestas células permite aos investigadores investigar a resposta à hormona tiroideia e a sua influência no neurodesenvolvimento e na diferenciação das células do neuroblastoma em fenótipos neuronais mais maduros. As vias de sinalização das proteínas cinase são outra área de estudo intenso nas células N2A, dado o seu papel crítico na mediação de vários processos celulares, incluindo o crescimento celular, a diferenciação e a resposta a sinais extracelulares.
Em resumo, a linha celular Neuro-2a (N2A), derivada do neuroblastoma do rato, constitui um modelo versátil para o estudo da neurogénese, da diferenciação neuronal e da sinalização dopaminérgica, fornecendo informações valiosas sobre os fundamentos moleculares dos processos de neurodesenvolvimento e das doenças neuroendócrinas.

Doença	Neuroblastoma

Sinónimos

- NEURO-2A
- Neuro 2a
- Neuro2a
- Neuro2A
- N-2a
- N2a
- N2A
- Nb2a
- NB2a

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Rato
Propriedades de crescimento	Aderente
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Tipo de célula	Células estaminais neuronais e ameboides

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFICADORES

Referência

Neuro-2a (número de catálogo Cytion 400394)

Número de identificação fiscal do NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_0470

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão do antígeno

H-2a

Vírus

Vírus da ectromelia (varíola do rato): negativo

Resistência aos vírus

Poliovírus 1

Transcriptase reversa	Negativo

Produtos

Tubulina, acetilcolinesterase

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

EMEM (MEM Eagle), com: 2 mM L-Glutamina, com: 2,2 g/L NaHCO3, com: EBSS (número de artigo Cytion 820100a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 10% de FBS e 1% de NEAA

Reagente de dissociação	Accutase

Subcultura

Retirar o meio antigo das células aderentes e lavá-las com PBS sem cálcio e magnésio. Nos frascos T25, utilizar 3-5 ml de PBS e nos frascos T75, 5-10 ml. Em seguida, cobrir completamente as células com Accutase, utilizando 1-2 ml para os frascos T25 e 2,5 ml para os frascos T75. Deixar as células incubar à temperatura ambiente durante 8-10 minutos para as destacar. Após a incubação, misturar suavemente as células com 10 ml de meio para as ressuspender e, em seguida, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Deitar fora o sobrenadante, ressuspender as células em meio fresco e transferi-las para novos frascos que já contenham meio fresco.

Densidade de sementeira	1 x 10^4 células/cm^2
Renovação de fluidos	1 a 2 vezes por semana
Recuperação após o descongelamento	Após o descongelamento, coloque as células em placas a uma densidade de 5 x 10^4 células/cm^2 e deixe-as recuperar do processo de congelamento e aderir durante pelo menos 24 horas.

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Raça / subespécie	A/J

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Aviso legal

As nossas células são fornecidas exclusivamente para fins de investigação laboratorial in vitro e não se destinam a utilização clínica ou de diagnóstico, nem devem ser administradas a seres humanos ou utilizadas para fins veterinários. Os utilizadores devem aderir a todas as diretrizes e regulamentos aplicáveis para o manuseamento e utilização destas células num ambiente de investigação.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes