O-342

500305

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

O-342 ląstelių linija yra kilusi iš žiurkių kiaušidžių naviko ir plačiai naudojama vėžio tyrimuose, ypač tyrimuose, susijusiuose su kiaušidžių vėžiu ir atsparumu chemoterapijai. Ši ląstelių linija pasižymi gebėjimu augti monosluoksniu ir maždaug po 24 valandų nuo pasėjimo pereiti į logaritminę augimo fazę, o ląstelių populiacijos padvigubėjimo laikas yra apie 24 valandos. O-342 ląstelių linija yra kelių sublinijų, įskaitant cisplatino atsparią O-342/DDP sublinią, kuri buvo sukurta laipsniškai didinant cisplatino koncentraciją in vitro, tėvinė linija.
O-342 ląstelės pasižymi heteroploidija chromosomų struktūroje, o tai kontrastuoja su beveik diploidiniu kariotipu, stebimu O-342/DDP sublinijoje. Šis kariotipinis pokytis rodo selektyvų spaudimą, kurį daro nuolatinis cisplatino poveikis, kuris eliminuoja cisplatinui jautrią subpopuliaciją, dėl ko dominuoja atsparios ląstelės. Biocheminiai tyrimai parodė, kad O-342/DDP ląstelės yra 33 kartus atsparesnės cisplatinui nei pirminės O-342 ląstelės. Šis atsparumas atsispindi ID50 vertėse: O-342/DDP ląstelių ID50 yra 33 µM, palyginti su 1 µM O-342 ląstelėse.
Tolesni tyrimai parodė, kad O-342/DDP ląstelės turi žymiai didesnį ląstelių vidaus bendrą glutationo (GSH+GSSG) kiekį – 3,04 nmol/10^6 ląstelių, palyginti su 1,37 nmol/10^6 ląstelių O-342 ląstelėse. Padidėjęs glutationo kiekis yra susijęs su sustiprintais detoksikacijos gebėjimais, prisidedančiais prie O-342/DDP ląstelėse stebimo atsparumo chemoterapijai. Be to, po cisplatino gydymo DNR grandžių tarpusavio jungtys ir viengubos grandinės lūžiai yra žymiai didesni tėviniuose O-342 ląstelėse nei atspariose O-342/DDP ląstelėse, o tai rodo padidėjusį DNR remonto gebėjimą atsparioje sublinijoje.
Apskritai, O-342 ląstelių linija kartu su cisplatino atsparia sublinija O-342/DDP yra patikimas modelis kiaušidžių vėžio chemoresistentiškumo mechanizmų tyrimams. Šios ląstelių linijos yra neįkainojamos nustatant potencialius terapinius tikslus ir kuriant strategijas chemoterapijos atsparumui įveikti, taip gerinant kiaušidžių vėžio pacientų gydymo rezultatus.

Audinys	Kiaušidės
Liga	Adenokarcinoma

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žiurkė
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Į epitelį panašus

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

O-342 (Cytion katalogo numeris 500305)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	10116
Cellosaurus	CVCL_5847

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutaminas, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion gaminio numeris 820100a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS ir 1 % NEAA

Disociacijos reagentas	Accutase

Subkultūrinis auginimas

Pašalinkite seną terpę nuo prilipusių ląstelių ir nuplaukite jas PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio. T25 kolboms naudokite 3-5 ml PBS, o T75 kolboms - 5-10 ml. Tuomet visiškai užpilkite ląsteles "Accutase", naudodami 1-2 ml T25 kolboms ir 2,5 ml T75 kolboms. Leiskite ląstelėms inkubuotis kambario temperatūroje 8-10 minučių, kad jos atsiskirtų. Po inkubacijos atsargiai sumaišykite ląsteles su 10 ml terpės, kad jos vėl suspenduotų, tada 3 minutes centrifuguokite 300xg greičiu. Išmeskite supernatantą, vėl sutirpinkite ląsteles šviežioje terpėje ir perkelkite jas į naujas kolbas, kuriose jau yra šviežia terpė.

Skysčių atnaujinimas	2-3 kartus per savaitę

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Veislė / porūšis	BDIx

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Atsakomybės apribojimas

Mūsų ląstelės teikiamos tik in vitro laboratoriniams tyrimams ir nėra skirtos klinikiniam ar diagnostiniam naudojimui, jos taip pat nėra skirtos žmonėms ar naudojamos veterinarijos tikslais. Naudotojai privalo laikytis visų galiojančių rekomendacijų ir taisyklių, taikomų šių ląstelių tvarkymui ir naudojimui mokslinių tyrimų aplinkoje.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href="/Kas mes esame/garantijos/" hreflang="x-default">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes