O-342

500305

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunka O-342 pochádza z nádoru vaječníkov potkanov a je široko používaná vo výskume rakoviny, najmä v štúdiách zameraných na rakovinu vaječníkov a rezistenciu voči chemoterapii. Táto bunka sa vyznačuje schopnosťou rásť v monovrstve a vstúpiť do log-fázy rastu približne 24 hodín po zasiatí, pričom čas zdvojnásobenia buniek je približne 24 hodín. Bunka O-342 slúži ako rodičovská línia pre niekoľko podlín, vrátane podlínie O-342/DDP rezistentnej na cisplatinu, ktorá bola vyvinutá postupným zvyšovaním koncentrácií cisplatiny in vitro.
Bunky O-342 vykazujú heteroploidiu vo svojej chromozómovej štruktúre, čo kontrastuje s takmer diploidným karyotypom pozorovaným v sublínii O-342/DDP. Táto karyotypová zmena svedčí o selektívnom tlaku vyvíjanom nepretržitou expozíciou cisplatine, ktorá eliminuje subpopuláciu citlivú na cisplatinu, čo vedie k prevládaniu rezistentných buniek. Biochemické analýzy ukázali, že bunky O-342/DDP majú 33-násobne vyššiu rezistenciu voči cisplatine v porovnaní s rodičovskými bunkami O-342. Táto rezistencia sa odráža v hodnotách ID50, pričom bunky O-342/DDP majú ID50 33 µM v porovnaní s 1 µM v bunkách O-342.
Ďalšie štúdie odhalili, že bunky O-342/DDP majú výrazne vyššie hladiny intracelulárneho celkového glutatiónu (GSH+GSSG) na úrovni 3,04 nmol/10^6 buniek v porovnaní s 1,37 nmol/10^6 buniek v bunkách O-342. Zvýšené hladiny glutatiónu sú spojené so zvýšenou schopnosťou detoxikácie, čo prispieva k chemickej rezistencii pozorovanej v bunkách O-342/DDP. Okrem toho, po liečbe cisplatinou sú medzivláknové krížové väzby DNA a zlomy jednovláknových reťazcov výrazne vyššie v rodičovských bunkách O-342 ako v rezistentných bunkách O-342/DDP, čo naznačuje zvýšenú schopnosť opravy DNA v rezistentnej sublínii.
Celkovo bunka O-342 spolu so svojou cisplatinou rezistentnou podlinkou O-342/DDP poskytuje robustný model na skúmanie mechanizmov chemickej rezistencie pri rakovine vaječníkov. Tieto bunky sú neoceniteľné pre identifikáciu potenciálnych terapeutických cieľov a vývoj stratégií na prekonanie rezistencie voči chemoterapii, čím sa zlepšujú výsledky liečby pacientok s rakovinou vaječníkov.

Tkanivo	Vaječník
Choroba	Adenokarcinóm

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Potkan
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelu podobné

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

O-342 (katalógové číslo Cytion 500305)

Daňové identifikačné číslo NCBI	10116
Cellosaurus	CVCL_5847

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamín, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion číslo článku 820100a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10% FBS a 1% NEAA

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Plemeno / poddruh	BDIx

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Upozornenie

Naše bunky sa poskytujú výlučne na účely laboratórneho výskumu in vitro a nie sú určené na klinické alebo diagnostické použitie, ani sa nemajú podávať ľuďom alebo používať na veterinárne účely. Používatelia musia dodržiavať všetky platné smernice a predpisy pre manipuláciu a používanie týchto buniek vo výskumnom prostredí.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB