# O-342

500305

## ALLMÄN INFORMATION

**Beskrivning**

Cellinjen O-342 härstammar från en äggstockscancer hos råtta och används ofta inom cancerforskning, särskilt i studier som fokuserar på äggstockscancer och kemoterapiresistens. Denna cellinje kännetecknas av sin förmåga att växa i ett monolager och gå in i logfasen ungefär 24 timmar efter sådd, med en cellpopulation som fördubblas på cirka 24 timmar. Cellinjen O-342 fungerar som föräldralinje för flera underlinjer, inklusive den cisplatinresistenta underlinjen O-342/DDP, som utvecklades genom stegvis ökning av cisplatin-koncentrationer in vitro.
O-342-celler uppvisar heteroploidi i sin kromosomstruktur, vilket står i kontrast till den nästan diploida karyotypen som observerats i sublinjen O-342/DDP. Denna karyotypiska förändring är ett tecken på det selektiva tryck som utövas av kontinuerlig cisplatinexponering, vilket eliminerar den cisplatin-känsliga subpopulationen, vilket resulterar i en dominans av resistenta celler. Biokemiska analyser har visat att O-342/DDP-cellerna har en 33-faldig ökning av resistensen mot cisplatin jämfört med de ursprungliga O-342-cellerna. Denna resistens återspeglas i ID50-värdena, där O-342/DDP-cellerna har ett ID50-värde på 33 µM jämfört med 1 µM i O-342-cellerna.
Ytterligare studier har visat att O-342/DDP-cellerna har signifikant högre nivåer av intracellulärt totalt glutation (GSH+GSSG) på 3,04 nmol/$10^6$ celler, jämfört med 1,37 nmol/$10^6$ celler i O-342-cellerna. De ökade glutationnivåerna är förknippade med förbättrad avgiftningsförmåga, vilket bidrar till den kemoresistens som observerats i O-342/DDP-cellerna. Dessutom är DNA-tvärbindningar och enkelsträngsbrott efter cisplatinbehandling markant högre i de parentala O-342-cellerna än i de resistenta O-342/DDP-cellerna, vilket indikerar en ökad DNA-reparationsförmåga i den resistenta sublinjen.
Sammantaget utgör O-342-cellinjen, tillsammans med dess cisplatinresistenta sublinje O-342/DDP, en robust modell för att undersöka mekanismerna bakom kemoresistens vid äggstockscancer. Dessa cellinjer är ovärderliga för att identifiera potentiella terapeutiska mål och utveckla strategier för att övervinna resistens mot kemoterapi, vilket förbättrar behandlingsresultaten för patienter med äggstockscancer.

| | |
|---|---|
| **Vävnad** | Äggstock |
| **Sjukdom** | Adenocarcinom |

## KLASSIFICERING

| | |
|---|---|
| **Organism** | Råtta |
| **Kön** | Kvinna |
| **Tillväxtegenskaper** | Följsam |
| **Biosäkerhetsnivå** | 1 |

## EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| **Morfologi** | Epitelliknande |

## IDENTIFIERARE

**Källa**

O-342 (Cytion katalognummer 500305)

| | |
|---|---|
| **NCBI-skattenummer** | 10116 |
| **Cellosaurus** | CVCL_5847 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## HANTERING OCH ODLING

### Odlingsmedium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)

| | |
|---|---|
| **Inkubationsatmosfär** | 37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär. |

### Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS och 1% NEAA

| | |
|---|---|
| **Dissociationsmedel** | Accutase |

### Vidareodling

Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

| | |
|---|---|
| **Vätskeförnyelse** | 2 till 3 gånger per vecka |

### Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

### Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

| | |
|---|---|
| **Frysmedel** | Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress. |

### Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

### Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

## DONATOR

| | |
|---|---|
| **Ras / underart** | BDIx |

## JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

### Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

### Ansvarsfriskrivning

Våra celler tillhandahålls uteslutande för in vitro-laboratorieforskning och är inte avsedda för klinisk eller diagnostisk användning, och de ska inte heller administreras till människor eller användas för veterinära ändamål. Användare måste följa alla tillämpliga riktlinjer och föreskrifter för hantering och användning av dessa celler i en forskningsmiljö.

### Garanti

På Cytіon står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

| | |
|---|---|
| **Avtal om materialöverföring krävs** | Yes |