FRTL-5

500407

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

FRTL-5 rakuliin, mis on saadud roti normaalsetest kilpnäärme folliikularakkudest, mängib olulist rolli kilpnäärme uurimisel, keskendudes eelkõige selle näärme füsioloogiale ja patofüsioloogiale. Neid rakke iseloomustab nende sõltuvus kilpnääret stimuleerivast hormoonist (TSH) proliferatsiooniks, mis muudab nad oluliseks mudeliks TSH regulatsiooni ja kilpnäärmehormooni biosünteesi uurimiseks. Oluline on, et FRTL-5 rakud säilitavad võime võtta jodiidi, mis on oluline jodi metabolismi ja kilpnäärmehormoonide tootmise uurimiseks. See omadus rõhutab nende kasulikkust kilpnäärme funktsiooni ja talitlushäirete uurimisel.
Lisaks nende põhilisele rollile kilpnäärmehormooni uuringutes on FRTL-5 rakud olnud olulised kasvufaktorite, tsütokiinide ja onkogeenide mõju uurimisel kilpnäärme bioloogiale. Kilpnäärme-spetsiifiliste markerite, sealhulgas türeoglobuliini ja türoperoksidaasi järjepidev ekspressioon muudab nad väärtuslikuks molekulaar- ja rakubioloogilistes uuringutes, mille eesmärk on mõista kilpnäärmega seotud haigusi. Seetõttu kasutatakse FRTL-5 rakke sageli kilpnäärmevähi, autoimmuunse kilpnäärmehaiguse ja muude sellega seotud haiguste uurimisel, andes olulise panuse nende seisundite rakumehhanismide uurimisse.
Lisaks on FRTL-5 rakuliin olnud oluline autoimmuunsete kilpnäärme haiguste, näiteks Graves'i tõve uurimisel. Seda on kasutatud immunoglobuliinide aktiivsuse määramiseks inimproovides, pakkudes usaldusväärset ja korratavat mudelit autoimmuunse interaktsiooni uurimiseks kilpnäärmerakkudega. Nende rakkude kolmemõõtmeline kasvumuster pakub füsioloogiliselt asjakohasemat keskkonda rakkude käitumise ja rakkudevaheliste interaktsioonide uurimiseks kilpnäärme bioloogias. Need omadused koos FRTL-5 rakkude aastakümneid kestnud uuringutega rõhutavad nende tähtsust kilpnäärme tervise ja haiguste mõistmise edendamisel.

Kude	Thyroidea

Sünonüümid

- FRTL 5
- FRTL5
- FRTL-5 Cl 2

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Rott
Sugu	Määratlemata
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Kahekordistumisaeg	30-34 tundi

TUNNUSED

Viide

FRTL-5 (Cytioni kataloginumber 500407)

NCBI maksukood	10116
Cellosaurus	CVCL_0265

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

Ham's F12, w: 1,0 mM stabiilne glutamiin, w: 1,0 mM naatriumpüruvaat, w: 1,1 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820600a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendage keskkonda 5% FBS, 10 mg/L insuliini, 5 mg/L transferriini, 50 mikrogrammi/L hüdrokortisooni, 10 mikrogrammi/L somatostatiini, 10 mikrogrammi/L Gly-His-Lsy-atsetaadi, 0,0165 mikrogrammi/ml veiste TSH (kataloginumber T1614 Scripps Laboratories) - Lisage vajalik TSH vahetult enne kasutamist ja filtreerige steriilselt keskkonda.

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase

Kultuuri edasikasvatamine

Eemaldage kleepunud rakkudelt vana söötme ja peske neid PBS-ga, milles puudub kaltsium ja magneesium. T25 kolbide puhul kasutage 3-5 ml PBS-i ja T75 kolbide puhul 5-10 ml. Seejärel katke rakud täielikult Accutase'iga, kasutades 1-2 ml T25 kolbide puhul ja 2,5 ml T75 kolbide puhul. Laske rakkudel inkubeerida 8-10 minutit toatemperatuuril, et need eralduksid. Pärast inkubeerimist segage rakud ettevaatlikult 10 ml söötmega, et neid resuspenseerida, seejärel tsentrifuugige 3 minutit 300xg juures. Visake supernatant ära, suspenseerige rakud uuesti värskes keskkonnas ja viige need uutesse kolvidesse, mis sisaldavad juba värsket keskkonda.

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Tõug / alamliik	Fischer

Doonori vanus	6 nädalat

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Vastutuse välistamine

Meie rakud on ette nähtud üksnes in vitro laboratoorseks uurimistööks ning need ei ole mõeldud kliiniliseks või diagnostiliseks kasutamiseks, samuti ei tohi neid manustada inimestele ega kasutada veterinaarsetel eesmärkidel. Kasutajad peavad järgima kõiki kohaldatavaid suuniseid ja eeskirju nende rakkude käitlemise ja kasutamise kohta teadusuuringutes.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB