FRTL-5

500407

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az FRTL-5 sejtvonal, amely normális patkány pajzsmirigy tüszősejtekből származik, jelentős szerepet játszik a pajzsmirigy kutatásában, különösen a mirigy fiziológiájára és patofiziológiájára összpontosítva. Ezeket a sejteket az jellemzi, hogy a proliferációjuk a pajzsmirigy-stimuláló hormontól (TSH) függ, ami a TSH szabályozás és a pajzsmirigyhormon bioszintézisének tanulmányozásához nélkülözhetetlen modellé teszi őket. Fontos, hogy az FRTL-5 sejtek megőrzik a jodidfelvétel képességét, ami kulcsfontosságú a jodidanyagcsere és a pajzsmirigyhormonok termelésének vizsgálatához. Ez a tulajdonságuk aláhúzza hasznosságukat a pajzsmirigyműködés és -működési zavarok feltárásában.
A pajzsmirigyhormon-vizsgálatokban betöltött alapvető szerepük mellett az FRTL-5 sejtek fontos szerepet játszanak a növekedési faktorok, citokinek és onkogének pajzsmirigybiológiára gyakorolt hatásának vizsgálatában. A pajzsmirigy-specifikus markerek, köztük a tiroglobulin és a tiroperoxidáz következetes expressziója értékesnek teszi őket a pajzsmiriggyel kapcsolatos betegségek megértését célzó molekuláris és sejtbiológiai vizsgálatokban. Az FRTL-5 sejteket gyakran használják a pajzsmirigyrák, az autoimmun pajzsmirigybetegség és más kapcsolódó rendellenességek kutatásában, és jelentős betekintést nyújtanak az ezeket a betegségeket kiváltó sejtmechanizmusokba.
Ezen túlmenően az FRTL-5 sejtvonal döntő szerepet játszik az autoimmun pajzsmirigybetegségekkel, például a Basedow-kórral kapcsolatos kutatásokban. Ezt a vonalat használták az immunglobulinok aktivitásának vizsgálatára emberi mintákban, ami robusztus és reprodukálható modellt kínál a pajzsmirigysejtekkel való autoimmun kölcsönhatások tanulmányozásához. E sejtek háromdimenziós növekedési mintázata fiziológiailag relevánsabb környezetet biztosít a sejtek viselkedésének és a sejtek közötti kölcsönhatásoknak a pajzsmirigybiológiában történő vizsgálatához. Ezek a tulajdonságok, valamint az FRTL-5 sejteket hasznosító több évtizedes kutatások kiemelik fontosságukat a pajzsmirigy egészségének és betegségének megértésében.

Szövet	Thyroidea

Szinonimák

- FRTL 5
- FRTL5
- FRTL-5 Cl 2

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Patkány
Szex	Nem meghatározott
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Kettőzési idő	30-34 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

FRTL-5 (Cytion katalógusszám: 500407)

NCBI adóazonosító szám	10116
Cellosaurus	CVCL_0265

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

Ham's F12, w: 1,0 mM stabil glutamin, w: 1,0 mM nátrium-piruvát, w: 1,1 g/L NaHCO3 (Cytion cikkszám 820600a)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

Egészítse ki a táptalajt 5% FBS-szel, 10 mg/L inzulinnal, 5 mg/L transzferrinnel, 50 mikrogramm/L hidrokortionnal, 10 mikrogramm/L szomatosztatinnal, 10 mikrogramm/L Gly-His-Lsy-acetáttal, 0,0165 mikrogramm/mL szarvasmarha TSH-val (katalógusszám: T1614 a Scripps Laboratories-tól) - A szükséges TSH-t közvetlenül a felhasználás előtt adja hozzá, és steril szűrje a táptalajba.

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Faj / alfaj	Fischer
Az adományozó életkora	6 hét

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Jogi nyilatkozat

Sejtjeinket kizárólag in vitro laboratóriumi kutatási célokra bocsátjuk rendelkezésre, és nem szánjuk klinikai vagy diagnosztikai felhasználásra, nem adhatóak be embereknek, és nem használhatók fel állatorvosi célokra. A felhasználóknak be kell tartaniuk a sejtek kutatási környezetben történő kezelésére és felhasználására vonatkozó valamennyi vonatkozó irányelvet és előírást.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes