CLS-ACI-1

500459

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□ CLS-ACI-1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1998 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Cellosaurus	CVCL_5729

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Oncogenes

□□□□□□□□□□□□□□□□ Mycn □□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 2.5 □□□□□□□□□□□□ L-□□□□□□□□, w: 15 □□□□□□□□□□□□ HEPES, w: 0.5 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 1.2 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□ 3-5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T25 □□□ 5-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T75)□□□ Accutase (1-2 □□. □□□□□□□□□□□ T25, 2.5 □□. □□□□□□□□□□□ T75) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

□□ PCR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□