NRK-Pom121-EGFP3

500669

GENERAL INFORMATION

Description

NRK-Pom121-EGFP3□胞系来源于正常大鼠肾脏（NRK）□胞，经基因工程改造可表达Pom121-EGFP3融合蛋白。Pom121 是一种跨膜核蛋白，是核孔复合体（NPC）的重要组成部分，在核膜组装和 NPC 功能中发挥着关键作用。加入增强型绿色荧光蛋白（ EGFP3）标签有助于通过荧光显微镜观察和研究 Pom121 在活□胞内的动态、定位和相互作用。这使得 NRK-Pom121-EGFP3 □胞系成为研究核转运机制和 NPC 结构的重要工具。

NRK-Pom121-EGFP3 的亲本系 NRK □胞因其稳定的生长特性和上皮形态而常用于各种研究应用。表达 Pom121-EGFP3 的改造为研究人员提供了一个强大的模型，用于研究核胞质转运的分子机制、NPC 的结构组织及其在□胞分裂和分化过程中的调控。此外，这种 □胞系还可用于研究各种遗传和药物扰动对 NPC 功能的影响，为研究癌症和神经退行性疾病等与核转运缺陷有关的疾病提供深入的见解。

总之，NRK-Pom121-EGFP3 □胞系是□胞生物学和分子研究领域的一种先进工具，能让人们高分辨率地了解核胞质相互作用的动态过程。它能够在活 □胞环境中实时观察核□胞质成分，这使它在促进我们对□胞转运机制及其对健康和疾病的影响的理解方面具有非常重要的价值。

Tissue	肾脏

Synonyms

- NRK Pom121-EGFP3
- NRK Pom121-3EGFP
- NRK-Pom121-3EGFP

CLASSIFICATION

Organism	Rat
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	纺锤形纤维母□胞

IDENTIFIERS

Citation

NRK-Pom121-EGFP3（Cytion 目录号 500669）

NCBI TaxID	10116
Cellosaurus	CVCL_AV96
Depositor	艾伦伯格实验室（EMBL）

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Receptors expressed

表皮生长因子（EGF），增殖刺激活性（MSA）

Protein expression

Pom121-EGFP3：位置/基因：1...589 / Pcmv, 653...4250 / Pom121, 4251...4287 / null, 4318...6546 / 3EGFP, 7780...8574 / KanR/NeoR

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Products

表皮生长因子（EGF），增殖刺激活性（MSA），POM121，跨膜，核蛋白，CMV 促进因子，新霉素，磷酸转移酶

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM，w：4.5 克/升葡萄糖，w：4 毫摩尔 L-谷氨酰胺，w：3.7 克/升 NaHCO3，w：1.0 毫摩尔丙酮酸钠（Cytion 编号 820300a）。

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, 加湿环境。

Supplements

在培养基中添加 10% FBS ׳ 0.5 mg/mL G418

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

丢弃旧培养基，用 PBS 冲洗□胞。加入新配制的 0.025%胰酶/0.02%乙二胺四乙酸溶液，加热至 37 摄氏度，等待□胞分离，通常需要 5 分钟左右。加入新鲜培养基中和胰蛋白酶，然后将□胞混合物转移到离心管中并离心。离心后，除去上清液，用新鲜培养基重悬 □胞团，然后将悬浮液转移到新的烧瓶中。将 G418 加入培养基中，使其最终浓度达到 0.5 mg/ml

Seeding density	2至4×10⁴个□胞/平方厘米
Fluid renewal	每周 2 至 3 次

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

使用基于 PCR 的检测方法和基于发光的支原体检测方法排除支原体污染。
为确保没有□菌、真菌或酵母菌污染，每天都要对□胞培养物进行目视检查。

Freeze medium	我们使用完全生长培养基（包括 FBS）+10% DMSO 或 CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）作为冷冻保存培养基，以获得足够的解冻后存活率，CM-1（Cytion 商品目录编号 800100）含有优化的渗透保护剂和代谢稳定剂，可提高恢复能力并减少冷冻引起的应激。

Storage conditions

如需长期保存，可将样品瓶放入气相液氮中，温度约为 -150 至 -196 ℃。在-80 °C下保存只能作为转入液氮前的短暂过渡。

Shipping conditions

冷冻保存的□胞系用干冰装运，并用经过验证的隔热包装和足够的制冷剂在整个运输过程中保持约 -78 °C 的温度。收到货后，应立即检查容器，并立即将小瓶转移到适当的储藏室。

DONOR

Breed / subspecies	奥斯本-门德尔

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

计划将低温样品储存在液氮中以便将来解冻时，必须遵守严格的安全措施。在将冷冻样本移入或移出液氮罐时，必须穿戴适当的防护手套和防护服，并使用面罩或安全护目镜。这样做是为了降低在移出时因冷冻样品爆炸而造成伤害的风险，因为爆炸可能导致锋利的碎片飞溅。

Disclaimer

我们提供的□胞仅用于体外实验室研究目的，不用于临床或诊断用途，也不得用于人类或兽医目的。用户必须遵守在研究环境中处理和使用这些 □胞的所有适用准则和法规。

Warranty

在Cytion，我们保证产品的质量和活力。
我们保证，从我们的工厂发货后 60 天内，我们的□胞在开始培养时都是存活的。
我们保证所有材料均符合分析证书和 /或产品说明书中描述的规格。
有关详□信息，请参阅我们的 <a href="" /Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">保修声明。

Third-party agreements apply	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB