NRK-EGFP2-Nup50

500726

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie NRK-EGFP2-Nup50 je klonální stabilní buněčná linie odvozená z buněk normální ledviny potkana (NRK). Tato buněčná linie byla vytvořena transfekcí kruhového plazmidu obsahujícího gen kódující fúzní protein zesíleného zeleného fluorescenčního proteinu (EGFP) a nukleoporinu 50 (Nup50), po níž následovala selekce na rezistenci k léčivům. Výsledkem je, že přibližně 50 % buněk exprimuje fúzní protein EGFP3-Nup50, což umožňuje vizualizaci a sledování Nup50 v buněčném prostředí.
Nup50 je kritickou součástí komplexu jaderných pórů, který je zodpovědný za regulaci transportu molekul mezi jádrem a cytoplazmou. Značka EGFP3 umožňuje zobrazování živých buněk a další fluorescenční techniky ke studiu lokalizace, dynamiky a interakcí Nup50. Přestože se jedná o stabilní buněčnou linii, buňky NRK-EGFP2-Nup50 vykazují určitou variabilitu, což svědčí o proměnlivosti úrovně exprese fúzního proteinu EGFP3-Nup50 mezi buňkami.
Tato buněčná linie je zvláště cenná pro výzkum zaměřený na nukleocytoplazmatický transport, dynamiku komplexu jaderných pórů a funkční úlohu Nup50 v různých buněčných procesech. Buňky NRK-EGFP2-Nup50 jsou vhodné pro řadu experimentálních přístupů, včetně obnovy fluorescence po fotobleachingu (FRAP), fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) a dalších pokročilých mikroskopických technik. Tyto studie mohou poskytnout vhled do molekulárních mechanismů jaderného transportu a přispět k pochopení nemocí spojených s poruchou jaderného transportu, jako jsou některé druhy rakoviny a neurodegenerativní poruchy.

Tkáň	Ledviny

Synonyma

- NRK EGFP2-Nup50

KLASIFIKACE

Organismus	Krysa
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Fibroblastům podobné buňky s fusiformním tvarem

IDENTIFIKÁTORY

Citace

NRK-EGFP2-Nup50 (katalogové číslo Cytion 500726)

Daňové identifikační číslo NCBI	10116
Cellosaurus	CVCL_AV93
Vkladatel	Ellenbergova laboratoř (EMBL)

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Exprimované receptory

Epidermální růstový faktor (EGF), multiplikační stimulační aktivita (MSA)

Exprese proteinů

EGFP3-Nup50

Produkty

NUP50 (nukleoporin 50)

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutaminu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium 10% FBS, 0,5 mg/ml G418

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Staré médium zlikvidujte a buňky promyjte PBS. Přidejte čerstvě připravený 0,025% roztok trypsinu/0,02% EDTA zahřátý na 37 °C a počkejte, dokud se buňky neoddělí, což obvykle trvá asi 5 minut. Neutralizujte trypsin přidáním čerstvého média, poté přeneste směs buněk do zkumavky a odstřeďte. Po odstředění odeberte supernatant, resuspendujte buněčnou peletu v čerstvém kultivačním médiu a suspenzi přeneste do nových baněk. Přidejte G418 do kultivačního média, abyste dosáhli konečné koncentrace 0,5 mg/ml

Hustota výsevu	2 až 4 x 10^4 buněk/cm^2
Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Plemeno / poddruh	OsborneMendel

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše buňky jsou poskytovány výhradně pro účely laboratorního výzkumu in vitro a nejsou určeny pro klinické nebo diagnostické použití, ani nejsou určeny k podávání lidem nebo použití pro veterinární účely. Uživatelé musí dodržovat všechny platné pokyny a předpisy pro zacházení s těmito buňkami a jejich použití ve výzkumném prostředí.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Platí smlouvy s třetími stranami	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB