# MDCC-MSB1

601413

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Description

La lignée cellulaire MDCC-MSB1 est une lignée cellulaire lymphoblastoïde dérivée d'un poulet atteint de la maladie de Marek, une maladie virale très contagieuse causée par le virus de la maladie de Marek (MDV), qui appartient à la famille des herpèsvirus. Ces cellules sont largement utilisées dans la recherche vétérinaire en virologie et en immunologie pour étudier la pathogenèse du virus de la maladie de Marek, ainsi que pour le développement et l'évaluation de vaccins contre cette maladie. La lignée cellulaire MDCC-MSB1 présente des caractéristiques typiques des cellules lymphoïdes, telles que l'expression de marqueurs de surface spécifiques et la production de cytokines, qui sont cruciales pour comprendre la réponse immunitaire à l'infection par le MDV.
Outre son rôle dans la recherche sur le MDV, la lignée cellulaire MDCC-MSB1 est précieuse pour l'étude des mécanismes généraux de l'oncogenèse et de la réplication virale chez les espèces aviaires. Les cellules sont connues pour leur croissance robuste en suspension, ce qui facilite la production à grande échelle et la manipulation expérimentale. Les chercheurs utilisent cette lignée cellulaire pour étudier les interactions moléculaires entre le MDV et son hôte, pour identifier les facteurs viraux et hôtes impliqués dans la progression de la maladie, et pour cribler des composés antiviraux potentiels. Dans l'ensemble, la lignée cellulaire MDCC-MSB1 est un outil essentiel pour la recherche fondamentale et appliquée en virologie aviaire.

| | |
|---|---|
| **Maladie** | Maladie de Marek |

### Synonymes

- MDCC MSB1
- MDCC-MSB-1
- MSB-1
- MSB1

## CLASSIFICATION

| | |
|---|---|
| **Organisme** | Poulet |
| **Propriétés de croissance** | Suspension |
| **Niveau de biosécurité** | 1 |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Morphologie** | Cellules rondes |
| **Type de cellule** | Lymphoblaste |
| **Temps de doublement** | 10 heures |

## IDENTIFIANTS

### Référence

MDCC-MSB1 (numéro de catalogue Cytion 601413)

| | |
|---|---|
| **Numéro d'identification fiscale NCBI** | 9031 |
| **Cellosaurus** | CVCL_4542 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## MANIPULATION ET CULTURE

### Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

| | |
|---|---|
| **Atmosphère d'incubation** | 37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée. |

### Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

### Repiquage

Entretenez les cultures en ajoutant ou en remplaçant périodiquement le milieu. Démarrez les cultures avec une densité de 5 x $10^5$ cellules/ml et maintenez la concentration cellulaire dans une fourchette comprise entre 3 x $10^5$ et 1 x $10^6$ cellules/ml pour une croissance optimale.

| | |
|---|---|
| **Densité de semis** | 1 x $10^6$ cellules/ml |
| **Renouvellement des fluides** | 2 à 3 fois par semaine |
| **Récupération après le dégel** | Après décongélation, laisser les cellules se remettre du processus de congélation pendant au moins 24 heures. |

### Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

### Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

| | |
|---|---|
| **Milieu de congélation** | Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation. |

### Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

### Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

## ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

### Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

### Avertissement

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique, ni à être administrées à des êtres humains ou utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent se conformer à toutes les directives et réglementations applicables à la manipulation et à l'utilisation de ces cellules dans un cadre de recherche.

### Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

| | |
|---|---|
| **Un accord de transfert de matériel est requis** | Yes |