CHO-K1 suspension adapted

603486

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

Les cellules CHO-K1 sont une sous-ligne dérivée de la lignée cellulaire CHO, qui a été créée au début des années 1950 à partir d'un ovaire de hamster chinois. Les cellules CHO-K1 sont largement utilisées dans la production d'anticorps monoclonaux thérapeutiques et d'autres produits biopharmaceutiques. Leur utilisation intensive dans la production de protéines biopharmaceutiques et de vaccins est attribuée à leur nature eucaryote, qui permet un pliage, un assemblage et des modifications post-traductionnelles appropriées, telles que la glycosylation, qui influencent la stabilité, l'efficacité et la sécurité des protéines produites.
Dans le domaine de la production de protéines recombinantes, la lignée cellulaire CHO-K1 est utilisée pour exprimer un large éventail de protéines, notamment des anticorps monoclonaux, des facteurs de croissance, des cytokines et des enzymes. Ces protéines ont des applications dans les traitements thérapeutiques, les tests de diagnostic et les formulations de vaccins.
Les cellules CHO-K1 présentent un taux de croissance élevé et s'adaptent à diverses conditions de culture, y compris les cultures en suspension et les cultures adhérentes, ce qui les rend très utiles pour les processus de bioproduction à grande échelle. Elles possèdent un niveau élevé de stabilité génétique et sont utilisées pour le développement de lignées cellulaires stables car elles sont capables d'amplifier et d'exprimer efficacement des gènes exogènes, ce qui est essentiel pour produire des rendements élevés de protéines recombinantes.
Les cellules CHO-K1 de hamster chinois peuvent être facilement transfectées avec une variété de vecteurs pour l'expression des gènes, ce qui facilite l'édition ou l'élimination des gènes. Cette flexibilité permet aux chercheurs d'introduire des gènes spécifiques, de réduire des gènes au silence ou même d'effectuer une édition ciblée des gènes à l'aide de technologies telles que CRISPR-Cas9 dans les cellules hôtes CHO-K1.
En conclusion, les cellules CHO-K1 de hamster chinois et les cellules CHO sont essentielles à la recherche biotechnologique et à la production biopharmaceutique, offrant une plateforme polyvalente pour l'étude de la fonction des gènes et la production à grande échelle de protéines recombinantes.

Tissu	Ovaire

Applications

Cette lignée cellulaire est un choix optimal pour la toxicologie, la biotechnologie industrielle et la bioproduction.

Synonymes

- CHO K1
- CHOK1
- CHO cell clone K1
- GM15452

CLASSIFICATION

Organisme	Hamster chinois
Sexe	Femme
Propriétés de croissance	Suspension
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type épithélial

Caryotype

Distribution de la fréquence des chromosomes 50 cellules : 2n = 22. Le nombre de souches est hypodiploïde

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Temps de doublement	22 heures

IDENTIFIANTS

Référence

Suspension CHO-K1 adaptée (référence Cytion 603486)

Numéro d'identification fiscale NCBI	10029
Cellosaurus	CVCL_0214

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Sensibilité aux virus

Stomatite vésiculaire (Indiana), virus Getah Résistance aux virus : poliovirus 2, virus modoc, virus du saule à boutons

Transcriptase inverse	Négatif

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

CD CHO ThermoFisher, sans sérum, prêt à l'emploi.

Atmosphère d'incubation	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée. Les cellules doivent être cultivées sur un agitateur orbital, dans des flacons Erlenmeyer à cloisons, à une vitesse de 110 tr/min.

Compléments alimentaires

L-glutamine : ajouter jusqu'à une concentration finale de 8 mM (généralement 40 ml par litre d'une solution mère à 200 mM) avant utilisation. Cette étape est obligatoire pour les cellules CHO CD. Ajouter un agent anti-agglomérant à raison de 1:100 et un supplément HT à raison de 1:100 à la suspension cellulaire.

Réactif de dissociation	Aucun

Repiquage

Homogénéisez délicatement la suspension cellulaire dans le flacon en pipettant de haut en bas, puis prélevez un échantillon représentatif afin de déterminer la densité cellulaire par ml. Diluez la suspension afin d'obtenir une concentration cellulaire de 1 x 10^5 cellules/ml avec un milieu de culture frais, puis répartissez la suspension ajustée dans de nouveaux flacons pour poursuivre la culture.

Densité de semis	4 × 10^5 cellules/ml
Renouvellement des fluides	2 à 3 fois par semaine

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	Adulte

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Avertissement

Nos cellules sont fournies exclusivement à des fins de recherche in vitro en laboratoire et ne sont pas destinées à un usage clinique ou diagnostique, ni à être administrées à des êtres humains ou utilisées à des fins vétérinaires. Les utilisateurs doivent se conformer à toutes les directives et réglementations applicables à la manipulation et à l'utilisation de ces cellules dans un cadre de recherche.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes