PtK2

608316

GENERAL INFORMATION

Description

PtK2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Potorous tridactylis□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2n = 12□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PtK2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Virus susceptibility

□□□□□ A9□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Virus resistance

□□□ 5□□□□□□□ B5□□□□□□□□□ 2

Reverse transcriptase	□□

Products

□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640□w□2.0 mM □□□□□□□□w□2.0 g/L NaHCO3□Cytion □□□□ 820700a□□

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□

Supplements

□□□□□□□ 15% □ FBS

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□T25 □□□ 3-5 □□ PBS□T75 □□□ 5-10 □□□□□□ Accutase □□□□□□□□T25 □□□ 1-2 □□□T75 □□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□□ 8-10 □□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ -150 □ -196 ℃□□-80 °C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Shipping conditions

□□□ -78 °C □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DONOR

Donor age	□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□