Milieu de culture pour cellules endothéliales

850206

Le milieu de croissance pour cellules endothéliales est le milieu standard destiné à la culture de cellules endothéliales humaines issues de gros vaisseaux, tels que la veine ombilicale, l'artère ombilicale, la veine saphène et l'aorte. Le milieu complet contient du sérum fœtal de veau, de la L-glutamine, de l'ECGS/H (supplément de croissance pour cellules endothéliales avec héparine), de l'EGF, du bFGF et de l'hydrocortisone. Pour des facteurs de croissance recombinants définis, notamment le VEGF à la place de l'ECGS/H, optez pour le milieu de culture avancé pour cellules endothéliales. Nous proposons ce milieu sous forme de milieu de base de 500 ml, seul ou accompagné des suppléments, soit sous forme de composants individuels, soit sous forme de mélange de suppléments prémélangé. Les composants individuels permettent d'ajuster ou d'omettre certains facteurs, tandis que le mélange de suppléments s'ajoute en une seule étape. Le milieu de base est également disponible sans rouge de phénol dans les mêmes formats, ce qui évite toute interférence avec les mesures par fluorescence et colorimétriques, ainsi que la faible activité œstrogénique du rouge de phénol. Des suppléments sont nécessaires à l'utilisation, et les deux formats de suppléments sont également disponibles séparément. Une fois complété, le milieu complet contient 2 % de FCS (10 ml pour 500 ml de milieu de base).

DÉTAILS DU PRODUIT

Teneur sérique	2 % de FCS (10 ml de FCS pour 500 ml de milieu de base)
Recommandé	4 000 cellules/cm² (ensemencement initial jusqu'à environ 90 % de confluence)

Conservation et stabilité

Conservez le milieu de base entre 2 et 8 °C, à l'abri de la lumière, et les suppléments à −20 °C. Évitez les cycles répétés de congélation-décongélation des suppléments. Une fois enrichi, le milieu peut être conservé entre 2 et 8 °C, à l'abri de la lumière, pendant un mois au maximum. Ne congelez pas le milieu.

Caractéristiques techniques

pH 7,6, osmolalité 285 ± 10 mOsm/kg

Composants des compléments alimentaires

L-glutamine : 4 mM
FCS : 2 % (10 ml pour 500 ml de milieu de base)
ECGS/H (supplément de croissance pour cellules endothéliales avec héparine) : 12 µg/ml
EGF recombinant humain : 0,1 ng/ml
bFGF recombinant humain : 1 ng/ml
Hydrocortisone : 1 µg/ml
Antibiotiques (facultatifs) : gentamicine 50 µg/ml, amphotéricine B 50 ng/ml

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tableau de composition

Quantités de compléments pour 500 ml de milieu de base. Ces mêmes composants sont également disponibles sous forme de mélange prêt à l'emploi dans un flacon (Supplement-Mix, réf. 850178, 23,5 ml).

Composant	Volume	Référence
L-glutamine	10 ml	850121
FCS	10 ml	850107
ECGS/H (supplément de croissance des cellules endothéliales avec héparine)	2 ml	850122
EGF recombinant humain	0,5 ml	850111
bFGF recombinant humain	0,5 ml	850138
Hydrocortisone	0,5 ml	850130
Antibiotiques (en option)	3,5 ml	850119
Total (sans antibiotiques)	**23,5 ml**	

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB